



Homeopatinis požiūris į vaikų ligas ir dantukų dygimą

Dažniausiai užduodami klausimai
2 knyga



sveikos gyvensenos
akademija

Kodėl parašėme šią knygą Jums?

Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į ligą ir jos gydymą. Jei skauda ranką – išgeriame vaistų *nuo skausmo*, jei pakilo temperatūra – pavartojame vaistų *nuo temperatūros*. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip simptomų slopinimas. O ligos priežastis yra kita, tad ir temperatūra pakilo dėl tam tikros priežasties, o ir ranką skauda taip pat dėl konkrečios priežasties. Temperatūra – tai ligos simptomas, skausmas – taip pat ligos simptomas. Šiuolaikinė homeopatija kelia klausimus – *kodėl prasidėjo liga?* kokia yra atsiradusio simptomo priežastis? – ir veikia būtent tą priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gydytis, todėl homeopatiniais preparatais simptomas yra valdomas ir taip skatinama organizmo savireguliacija. Šiuolaikinio homeopatinio gydymo esmė – gydyti ligonį, o ne ligą.

Šiandien, kai žmonės visame pasaulyje serga vis sudėtingesnėmis ligomis, kai kas antras vaikas gimsta jau būdamas alergiškas, daugėja onkologinių ligų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, būtina kalbėti apie tai, kodėl reikia skleisti šį naują požiūrį į mediciną, nes šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo sistema, **turinti kitokį požiūrį į ligą nei įprastinis gydymas. Homeopatija ieško ligos priežasties, veikia tą priežastį ir taip padeda pasveikti.**

Tad šiandien galime drąsiai teigti, kad šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo metodas, dažniausiai neturintis šalutinio poveikio ir orientuotas į priežasties šalinimą, paskatindamas organizmo bioreguliacinius procesus. Plačiau skaitykite www.siuolaikinehomeopatija.lt.



Kūdikių ir vaikų neramumas, dantukų dygimas

Mažesnių ar didesnių negalavimų kalantis dantukams pasireiškia apie 70 proc. vaikų. Koks bus dantukų dygimas – skausmingas ar nepastebimas, priklauso taip pat ir nuo genų, o homeopatai tai vadina konstituciniu žmogaus tipu. Konstitucinis tipas, kurį atsinešame gimdami, lemia, kokiomis ligomis žmogus bus linkęs sirgti, kokiems gamtos veiksniams bus jautrus.



Dažniausiai užduodami klausimai apie dantukų dygimą, vaikų neramumą ir homeopatiją

**Į tėveliams rūpimus klausimus atsako gydytoja pediatrė homeopatė
IRAIDA ČYVIENĖ.**

Kada turėtų pasirodyti pirmieji dantukai? Ar vėliau išdygę bus sveikesni?

Paprastai pirmieji dantukai turėtų išdygti 6 mėn. kūdikiui. Tačiau nesame standartiniai vienetai, esame individualybės. Orientuotis galima į tai, kad dantukų dygimo procesas yra paveldimas. Vadinasi, jeigu mamai ar tėčiui dantukai išdygo 10 mėn., didelė tikimybė, kad panašiu laiku jie pradės kaltis ir jų atžalai. Todėl nerimauti, kad 6 mėn. dantukų dar nėra, tikrai nereikėtų. Mano praktikoje buvo vaikučių, kuriems dantukai išdygo 2 mėn., net ir gimusių su dantukais.

Kad vėliau išdygę dantukai bus sveikesni, tikrai nesu pastebėjusi ar skaičiusi apie tai mokslo literatūroje. Dantukų būklė labiau priklauso nuo genetikos, t. y. kokią kaulinį audinį vaikutis paveldėjo, taip pat jų priežiūros, ligų, vaistų vartojimo.

Kaip pasikeičia vaiko elgesys, kai kalasi dantukai? Ar gali dygti iš karto 2 ar 4? Ar dėl to vaiko savijauta bus blogesnė?

Kai kalasi dantukai, paburksta dantenos, vaikelis nuolat kiša pirštelius į burnytę, tarsi kažko ten ieškodamas. Pakėlę viršutinę lūpą galime pamatyti dantukų kontūrus. Dėl to, kad dantenos paburksta, mažylis gali greičiau pasigauti virusinę infekciją, dėl kurios gali pakilti temperatūra, tapti neramus. Sloga, ausyčių skausmas, aukštesnė temperatūra gali kamuoti ir be jokios virusinės ligos. Pvz., iš vakaro pakyla temperatūra, o ryte pasirodo pirmasis dantukas, ir temperatūra nukrenta. Arba vaikelis keletą kartų suviduriuoja, išdygsta dantukas, ir viskas praeina.

Pagal standartinę schemą, iš pradžių turėtų išdygti apatiniai kandžiai, po to – viršutiniai, vėliau kiti apatiniai ir t. t. Tačiau būna visaip, pvz., pirmieji pasirodo viršutiniai kandžiai. Tačiau niekada nebūna, kad pirmieji išdygtų iltiniai dantys.

Vienu metu gali dygti ir keli dantukai, bet dėl to vaikas tikrai nebūtinai jausis blogiau. Gali visiškai nepastebimai išdygti keli iš karto, o gali ir vienas kaltis su skausmu, bemiegėmis naktimis, dideliu seilėjimusi ir temperatūra. Viskas priklauso nuo konsultacinio tipo.



Ar skausminga, kai kalasi tik pirmieji dantukai? Ar dėl dantukų dygimo gali skaudėti ausytes? Kaip suprasti, kad vaikui skauda ausytes?

Dažniausiai negalavimų kelia pirmųjų dantukų dygimas. Manoma, kad iki metų vaikelis turėtų turėti 8 dantukus. Vėliau jų dygimo procesas vyksta mažiau pastebimai.

Dantukų dygimas gali sukelti ausyčių skausmą. Mat vaikų klausomasis (eustachijaus) vamzdis, jungiantis nosiaryklę su ausies būgnelio ertme, yra trumpesnis ir išsidėstęs kitu kampu nei suaugusiųjų. Būtent dėl anatominių mažų vaikų ausies savybių bet kokia infekcija ar gleivės iš nosies ar burnos lengviau patenka į ausį. Kadangi dantukams dygstant dantenos smarkiai paburksta, vaikelis seilėjasi, jį gali kankinti sloga, visa tai gali skatinti ir ausų skausmą. Paprastai, jeigu skauda ausytes, vaikelis labai skaudžiai verkia, klykia, nes skausmas išties stiprus, blogai miega naktį. Jeigu įtariate, kad skauda ausytes, būtinai rekomenduoju apsilankyti pas gydytoją, net jeigu jums atrodo, kad viskas jau praėjo.

Ar būtina tėvams reaguoti į neramų vaiko elgesį, nedidelį karščiavimą, kitus negalavimus, kurie pasireiškia kalantis dantukams? Kodėl svarbu, kad vaikas nekenėtų?

Reaguoti būtina, ir mamos dažniausiai reaguoja. Šiuo metu vaikus auginančios mamytės bet kada gali susiekti su gydytoju telefonu. Jei pokalbis telefonu mamytės netenkinama, tariamasi dėl mažylio apžiūros. Iš praktikos galiu pasakyti, kad mamoms to dažniausiai ir reikia, t. y., kad gydytojas apžiūrėtų ir patvirtintų, jog nieko blogo jų atžalai nėra. Taip pat rekomenduoju ir vaistų, skirtų dantukų dygimo simptomams malšinti. Pvz., homeopatinį žvakučių *Viburcol*, kurios tinka karščiavimui, neramumui gydyti, taip pat esant kitiems dantukų kalimosi metu pasireiškiantiems negalavimams, ausyčių skausmui mažinti.

Svarbu, kad vaikelis nekenėtų. Numalšinus simptomus, kūdikėlis geriau miega, nebūna irzlus, jam mažiau skauda, o kartu geresnė tampa ir mamos savijauta, nes ir ji išsimiega.

Ar mamos susipažinusios su homeopatija, ar tenka aiškinti nuo nulio? Kuo skiriasi homeopatiniai preparatai nuo kitų cheminių ar augalinių vaistų?

Apie homeopatiją mamytėms aiškinti reikia, nes daugelis jų homeopatiją tapatina su gydymu augaliniiais preparatais, ir tai klaidinga. Pirmiausia dėl to, kad homeopatiniai vaistiniai preparatai gaminami ne tik iš augalinės, bet ir iš mineralinės bei gyvūninės kilmės medžiagų. Be to, jie visiškai kitaip ruošiami – skiedžiami ir purto-

mi, t. y. potencijuojami ir dinamizuojami. Dažniausiai yra vartojama D – dešimtinė (vaisto ir skiediklio santykis 1:9) potencija.

Homeopatinio ir cheminio gydymo principus palyginsiu vienu pavyzdžiu. Įkišote ranką į ugnį, jums skauda, vartojate vaistų nuo skausmo, tačiau ranką tebelaikote ugnyje. O homeopatinis gydymas – ištraukti ranką iš ugnies, t.y. ieškoti priežasties ir ją įveikti.

Šalutinių poveikių vartojant homeopatinių preparatų nėra, arba jie pasitaiko labai retai. Gali pasireikšti pirminis homeopatinis pablogėjimas, kuris, beje, ir parodo, kad parinktas tinkamas vaistas, nes homeopatiniai preparatai skatina patį organizmą kovoti su liga.

Kas įeina į homeopatinių žvakučių *Viburcol* sudėtį? Kaip jas vartoti?

Visų pirma, dantukų dygimo metu vaikelis būna jautrus, irzlus, neramus. Todėl *Viburcol* žvakučių sudėtyje yra vaistinės ramunės (lot. *Chamomilla recutita*), kuri ramina, mažina uždegimą. Kiekvienam tėveliui savas vaikas yra perliukas, minkštutis, putlulis, nors neretai užsispyręs. Tai atspindi jūros perlai: jų moliuskai minkštučiai, kiautas – kietas (atitinka užsispyrusį vaikelį). Vaiste yra *Calcium carbonicum Hahnemanni*, išgaunamo iš austrių (jūros moliuskų) geldelių vidinės baltosios dalies. Taip pat preparate yra vaistinės šunvyšnės (lot. *Atropa belladonna*), kuri padeda, kai karščiuojama, paprastojo karklavijo (lot. *Solanum dulcamara*), kuris tinka, kai kimba sloga, temperatūra, o būtent tokie simptomai ir pasireiškia dygstant dantukams. Pievinė šilagėlė (lot. *Pulsatilla pratensis*) – tinka jautriems, dažnai verkšlenantiems, visuomet norintiems būti ant mamos rankų, besiglaustantiems vaikams. Vėlgį, dantukų dygimo periodu daugelis kūdikėlių tampa būtent tokie. Plačialapis gyslotis (lot. *Plantago major*) nuo neatmenamų laikų dėl savo baktericidinių, uždegimą slopinančių savybių dedamas ant žaizdų, kraujavimui stabdyti. Net ir kūdikėliams, pasitarus su gydytoju, galima vartoti visą *Viburcol* žvakutę. Jei gu mamos labai nerimauja, gali žvakutę skelti pusiau išilgai. Paprastai jaunesniems kaip 2 metų vaikams užtenka vartoti po 1 žvakutę 2 kartus per dieną. Vyresniems vaikams, atsižvelgiant į amžių, – po 1 žvakutę 3–4 kartus per dieną.

Kuo gali padėti homeopatija esant bakteriniams uždegimams?

Homeopatas kelia klausimą, kodėl žmogaus organizme rado vietą bakterijos. Jos dauginasi ten, kur sutrikdyta fiziologinė pusiausvyra ir kur nešvaru, todėl, esant bakteriniams uždegimams, labai svarbi organizmo detoksikacija. Tikslinga natūrali



stiprinanti ir efektyvi pagalba homeopatiniais vaistiniais preparatais, kad pradėtų veikti paties organizmo sveikimo mechanizmai. Būtina detoksikacija, kad organizmas galėtų sutelkti imuninę sistemą kovai su bakterijomis. Rekomenduojama vartoti detoksikuojantį homeopatinį vaistų rinkinį (*Nux vomica-Homaccord* geriamieji lašai, *Berberis-Homaccord* geriamieji lašai, *Lymphomyosot* geriamieji lašai), kartu *Hepeel* tabletes, kaip pagalbą kepenims ir kepenų išsivalymo aktyvintoją. Kovojant su bakterijomis imuninei sistemai stiprinti tinka *Echinacea compositum Cosmoplex* tabletės. Jei vargina angina, skiriame *Angin-Heel S* tabletes ir *Mercurius-Heel S* tabletes.

Kuo gali padėti homeopatiniai vaistiniai preparatai esant gerklės skausmui, tonzilitui?

Gerklės skausmas ir tonzilitas parodo, kad organizmo imuninei sistemai nepakanka jėgų pašalinti nereikalingas toksines medžiagas iš organizmo. Todėl būtinas organizmo detoksikavimas vartojant homeopatinį vaistų rinkinį (*Nux vomica-Homaccord*, *Berberis-Homaccord*, *Lymphomyosot* geriamieji lašai). Imunitetui stiprinti – *Engystol* tabletės ir *Echinacea compositum Cosmoplex* tabletės. *Angin-Heel S* tabletes tikslinga vartoti atsiradus gerklės skausmui.

Kas efektyviausia vaikams iš homeopatinį preparatų varginant slogai?

Sloga – dažnai pasitaikanti ir, atrodytų, paprasta liga. Tokiu atveju efektyvus *Euphorbium compositum S* nosies purškalas, jei vaikas neramus, jį galima derinti su *Viburcol* žvakutėmis. Užsitęsusi sloga dažniausiai vargina dėl įvairių priežasčių, ypač jei dažnai kartojasi. Esant tokiai slogai, reiktų pavartoti geriamuosius lašus *Naso-Heel SN*. Slogai užsitęsus, organizmo imuninei sistemai nepakanka jėgų pašalinti nereikalingas toksines medžiagas iš organizmo, tad būtina natūrali stiprinanti homeopatinė pagalba, kad paskatintų veikti organizmo sveikimo mechanizmus, tai atlieka detoksikuojantis homeopatinis vaistų rinkinys (*Nux vomica-Homaccord*, *Berberis-Homaccord*, *Lymphomyosot* geriamieji lašai). *Engystol* tabletės skiriamos imuninei sistemai stiprinti kovojant su virusinėmis infekcijomis, *Echinacea compositum Cosmoplex* tabletės veiksmingos imuninei sistemai stiprinti kovojant su bakterijomis.

Kuo naudinga homeopatija, kai vaikai turi polinkį dažnai sirgti virusinėmis ligomis?

Virusinių infekcijų ar persišaldymo metu tikslinga kartu vartoti homeopatinis vaistinius preparatus *Engystol* tabletes, *Gripp-Heel* tabletes ir *Euphorbium compositum S* nosies purškala, tai galima vartoti ir norint apsaugoti epidemijų metu, 2–3 kartus per dieną.

Jei vaikas turi polinkį dažnai sirgti peršalimo ligomis, *Engystol* tabletes galima vartoti

ilgesnį laiką (iki 4–5 sav., padarant 2–3 dienų pertraukas). Rudens ir žiemos periodu idealu vartoti *Engystol* tabletes kartu su *Gripp-Heel* tabletėmis. Tik prasidėjus virusinei infekcijai, tinka vartoti po 1 tab. dažniau (atsižvelgiant į vaiko amžių) – taip suteiksime efektyvią pagalbą mūsų imuninei sistemai ir organizmui. Susirgus galima vartoti 5–12 kartų per dieną po 1 tabletę. Rekomenduojama įtraukti homeopatinių vaistų rinkinį organizmui detoksikuoti. Virusinės infekcijos vaikams yra mankšta ir imuninės sistemos sustiprinimas, panašiai, kaip raumenims fiziniai pratimai. Tik svarbu rinktis homeopatiją ir natūralias priemones, kurios padėtų organizmui susitvarkyti su virusais.

Ką galite patarti, kai vaikas serga virusiniu laringitu?

Sergant virusine infekcija, kai vaiką kamuoja užkimimams ar spazminis kosulys, esant laringitui ar faringitui, vaikui padės *Phosphor-Homaccord* geriamieji lašai. Kartu tikslinga derinti *Engystol* tabletes.

Kokios homeopatijos galimybės, kai vaikams atsiranda virškinimo sistemos sutrikimų?

Gana dažni virškinimo sutrikimai vargina ir vaikus. Esant tokiems negalavimams yra plačios homeopatijos galimybės. *Gastricumel* tabletės rekomenduojamos esant skrandžio sutrikimams ir rėmens graužimui, *Spascupreel* tabletės efektyvios varginant spazminiams pilvo skausmams. Svarbu išsiaiškinti, ko vaikai „negali suvirškinti kasdienybėje“ – gal dėl to kalti atsiradę adaptacijos sutrikimai darželyje, stresas ir įtampa mokykloje bendraujant su draugais ar esant dideliems mokslo krūviams. Todėl minėtus preparatus tikslinga derinti su homeopatiniais nervų sistemą veikiančiais vaistais. Vyresniems tinka *Neurexan* tabletės, *Nervoheel N* tabletės ar *Ypsiloheel N* tabletės bei *Ignatia-Homaccord* geriamieji lašai. Mažiems vaikams – *Viburcol* žvakutės. Virškinimo sistemai efektyvi pagalba yra detoksikuojantis homeopatinių vaistų rinkinys (*Nux vomica-Homaccord*, *Lymphomyosot*, *Berberis-Homaccord* geriamieji lašai) – tai organizmo detoksikavimas, imuninės sistemos sustiprinimas.



Mitai ir tikrovė apie homeopatinius vaistus

1. Mitas: Homeopatijos negalima vartoti bet kokiame amžiuje.

Tikrovė: Homeopatiją galima vartoti nuo pirmos gimimo dienos iki gyvenimo pabaigos.

2. Mitas: Homeopatija labai lėtai veikia.

Tikrovė: Ūminiu atveju parinkus tinkamą preparatą, poveikis yra greitas.

3. Mitas: Homeopatinį preparatų negalima vartoti ilgą laiką.

Tikrovė: Galima vartoti ilgesnį laiką, net kelerius metus, tačiau geriausia pasi-konsultuoti su gydytoju.

4. Mitas: Homeopatija – jauna sritis, tad mažai ištirta.

Tikrovė: Šio mokslo ištakos siekia Hipokrato laikus, tačiau homeopatiją pasiūlė ir išplėtojo Leipcigo universiteto profesorius Samuelis Hanemanas XVII a. viduryje.

5. Mitas: Lietuvoje homeopatija taikoma neseniai.

Tikrovė: Ankstyviausių užuominų apie homeopatinį gydymą galima rasti XIX a. pradžios Vilniaus universiteto medikų darbuose. Pirmoji homeopatinė vaistinė Vilniuje atsidarė 1864 metais.

6. Mitas: Šioje srityje dirba mažai gydytojų.

Tikrovė: Šiuo metu Lietuvoje yra Lietuvos homeopatų asociacija ir Homeopati-jos ir homotoksikologijos asociacija, kurios vienija daugiau nei 200 gydytojų ir vaistininčių.

7. Mitas: Homeopatija tai lygu augaliniai vaistai.

Tikrovė: Homeopatijoje dažniausiai naudojamos augalinės, gyvūninės, minera-linės kilmės medžiagos.

8. Mitas: Homeopatiniai vaistai labai smarkiai atskiesti.

Tikrovė: Homeopatinų, kaip ir visų kitų vaistų, gamybą reglamentuoja Europos farmakopėja, kurioje nurodyta iš kokių žaliavų ir pagal kokius principus gami-nami vaistai.

Gaminant homeopatinius vaistus naudojami:

- 1) augalai, iš jų gaminama daugiau kaip pusė visų preparatų. Naudojami tik natūraliai, ekologiškose augimvietėse užaugę augalai, kurie perdirbami ne-delsiant, jei ne – užšaldomi. Pramoninėje vaistų gamyboje naudojami augalai dažniausiai būna užauginti Alpėse įsteigtose augimvietėse;

2) gyvūninė žaliava, pvz., bitė;

3) neorganinės medžiagos – auksas, sidabras, fosforas, smėlis. Vaistiniai preparatai iš mineralų sudaro iki 30 proc. vaistų;

Yra 3 gamybos etapai. I etapas – ruošinių gamyba. Šiame etape iš surinktos augalinės žaliavos daromos ištraukos – urtinktūros. Jų gamyba priklauso nuo žaliavoj esančios drėgmės kiekio, eterinių ir kitų lakiųjų medžiagų. II etapas – skiedinių gamyba. Dažniausiai naudojami dešimtkartiniai ir šimtakartiniai praskiedimai, kurie žymimi romėniškais skaitmenimis: D – dešimtkartinis praskiedimas, t.y. 1 dalis vaistinės medžiagos ir 9 dalys skiediklio; C – šimtakartinis praskiedimas, t.y. 1 dalis vaistinės medžiagos ir 99 dalys skiediklio. Homeopatiniai skiediniai gaminami potencijuojant. Yra du vienas po kito einantys etapai: praskiedimas ir dinamizacija (sumaišymas arba sukratymas). Ir III etapas – vaistų formų gamyba.

9. **Mitas: Homeopatiniai vaistai nesaugūs nėštumo metu.**

Tikrovė: Nėštumo ir žindymo metu homeopatiniai vaistai nėra kontraindikuotini, išskyrus retus atvejus. Prieš vartojant vaistus pasitarti su gydytoju.

10. **Mitas: Jei pradėjus gydytis homeopatiniais vaistais liga paūmėjo, tai nenormalu.**

Tikrovė: Neretai gydant lėtines ligas ligoniui, pradėjus vartoti homeopatinį vaistą, gali atsirasti ligos paūmėjimo simptomų. Tai rodo, kad vaistas parinktas teisingai. Jei paūmėjimas yra stiprus, tada reikia trumpam nutraukti vaisto vartojimą, o simptomams susilpnėjus, vartoti pusę dozės.

11. **Mitas: Vartojant homeopatinius vaistus galima valgyti ir gerti viską.**

Tikrovė: Patartina nevertoti mėtų, alkoholio. Kavą gerti praėjus bent 2 val. po vaistų pavartojimo.

12. **Mitas: Lietuvoje homeopatija nėra įteisinta, tai šarlatanizmas, o ne mokslinis gydymas.**

Tikrovė: Homeopatija nuo pat savo atsiradimo daugiau nei prieš 200 m. buvo moksliška. Jos pradininkas vokiečių gydytojas Samuelis Hanemanas savo hipotezes dėl homeopatinių vaistų veikimo pirmiausia išbandė su savimi, vėliau – su sveikais savanoriais. Homeopatija – tai gydymas panašiu, t.y. pacientui skiriamas toks vaistas, kuris panašius kaip jo ligos simptomus sukėlė sveikiems savanoriams vaisto bandymo metu. Visi esame ragavę kavos, kuri žvalina, padeda neužmigti. Homeopatiškai paruošta kava gydys nemigą. Tai ir būtų vienas panašumo principo pavyzdžių.



Nuo 1999 m. Lietuvoje homeopatija priskirta siauroms medicinos praktikos specializacijoms. Eidami pas gydytoją homeopatą Lietuvoje, jūs visada pakliūsite pas gydytoją, kuris turi ne tik reikiamų universitetinės medicinos žinių, bet ir homeopatijos žinių, kurios leis negalavimus šalinti dažniausiai šalutinio poveikio neturinčiais vaistais.

13. Mitas: Homeopatija gynybines organizmo funkcijas ne aktyvina, o slopina.

Tikrovė: Homeopatija stiprina apsaugines organizmo jėgas, padėdama šalinti iš organizmo toksinus. Homeopatiniai vaistai gali suaktyvinti tuos organizmo organus, kurie dirba vangiai, ir apraminti tuos, kurie dirba pernelyg aktyviai. Kai organai dirba darniai, kaip vieninga komanda, jie puikiai pašalina tai, kas į organizmą pakliuvo ar jame susidarė netinkamo. Todėl homeopatai nerekomenduoja smarkiai mažinti temperatūros, stabdančios virusų ir bakterijų dauginimąsi (tai net ir pavojinga, nes meningokoko sukėlėjas geriausiai veisiasi, kai temperatūra yra 37 °C), neslopina kūno išskyrų, su kuriomis šalinami toksinai. Stiprias organizmo reakcijas homeopatiniai vaistai gali kiek sušvelninti, bet pagrindinį sveikatinamąjį poveikį gauname būtent dėl organizmo funkcinių sistemų veiklos suderinimo.

14. Mitas: Homeopatiniai vaistiniai preparatai gali sukelti šalutinių poveikių?

Tikrovė: Pagrindinis homeopatinų vaistų poveikis yra ne cheminis, nors kai kurias pradines medžiagos savybes mažai skiesti tirpalai gali išsaugoti. Tačiau jei vaisto žaliava turi stiprų poveikį, homeopatinė farmakopėja draudžia ją vartoti per mažai atskiestą. Taip užbėgama už akių vaistų šalutiniam poveikiui. O vartojant vaistą atsiradusios toksinų šalinimo reakcijos (pvz., nosies išskyros, laisvesni viduriai, pabėrimas, temperatūra) ir yra organizmo būdas atsikratyti toksinų. Su šiais trumpalaikiais negalavimais kovoti nereikėtų. Jei kartais organizmas sureaguoja labai audringai, vaistų vartojimas trumpam sustabdomas ir tęsiamas pradinei reakcijai apimus.

15. Mitas: Daugumai pacientų homeopatinis gydymas netinka

Tikrovė: Nėra būklių, kai negalima vartoti homeopatinų vaistų. Tik kartais homeopatinis gydymas bus pagrindinis, o kartais jis bus vartojamas greita kito gydymo, pvz., operacijos, chemoterapijos, kt. Nėra gydymo apribojimų ir dėl amžiaus. Daugumą vaistų gali vartoti nėščios ir žindančios moterys.

16. Mitas: Homeopatiniai vaistai neturi privalumų.

Tikrovė: Homeopatinų vaistų privalumai yra šie:

- 1) patogu vartoti: yra žirnelių, tablečių, tirpalų ir kt. formos. Turi saldoką skonį arba beskoniai, todėl lengvai vartoja vaikai;
- 2) veikimas gydant ūmines ligas pasireiškia labai greitai;
- 3) gaminami daugkartinio praskiedimo būdu, todėl perdozuoti praktiškai neįmanoma.

17. Mitas: Homeopatinių vaistų poveikis prilygsta placebui.

Tikrovė: Šiandien medicinos mokslinių duomenų bazėje *PubMed* įvedus raktažodį „*homeopathic*“, randami 4854 moksliniai šaltiniai, o raktažodį „*homeopathy*“ – 4478. Maždaug 2/3 šių šaltinių publikuoja tyrimų rezultatus, kuriuose eksperimentais įrodomas homeopatinių vaistų farmakologinis aktyvumas. Šiuo atveju būtų teisinga paklausti: ar visada veiksmingas gydymas tradiciniais medikamentais? ar visada veiksmingas gydymas fitopreparatais? PSO Europos sveikatos politikos dokumente „Sveikata visiems XXI amžiuje“ skelbiama, kad visų Europos šalių vyriausybių tikslas – sveikata visiems. Šiam tikslui pasiekti gydytojai ir kitų medicinos specialybių atstovai turėtų suderinti fitoterapijos, homeopatijos, įprastinės medicinos žinias ir padėti pagrindus kompleksinei medicinai. Taigi homeopatiniai preparatai yra įtraukti į Europos farmakopėją ir yra visateisiai vaistai.

Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt



Homeopatiniai vaistiniai preparatai

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Angin-Heel® S tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Hydrargyrum bichyanatum D8 30 mg, Phytolacca americana D4 30 mg, Apis mellifica D4 30 mg, Arnica montana D4 30 mg, Hepar sulfuris D6 60 mg, Solanum dulcamara D4 60 mg, Atropa bella-donna D4 60 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Dėl ryklės ir tonzilių uždegimo atsiradusio pasunkėjusio rijimo, skausmo ir ryklės paraudimo mažinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atveju – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atveju – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atveju – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., arnikai, ar kitiems astrinių (graižadžiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei *Angin-Heel S* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Dėl homeopatinės veikliosios medžiagos *Hydrargyrum bichyanatum* (gyvsidabrio) gali prasidėti alerginės reakcijos ar padidėti seilėtekis. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia nutraukti ir pasitarti su gydytoju. Pavieniais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų žmonėms, kuriems yra nustatytas padidėjęs jautrumas astrinių (graižadžiedžių) šeimos augalams, pvz., arnikai.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Šlapimo takų uždegimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.

Pastaba. Ilgalaiį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei *Berberis-Homaccord* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Engystol® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną).

1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Engystol* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Vartojant *Engystol* tablečių, pavieniais atvejais gali išberti odą. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Pašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Euphorbium compositum S nosies purškalas (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (99,4 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Euphorbium D4 1 g, Pulsatilla pratensis D2 1 g, Luffa operculata D2 1 g, Hydrargyrum biiodatum D8 1 g, Mucosa nasalis suis D8 1 g, Hepar sulfuris D10 1 g, Argentum nitricum D10 1 g, Sinusitis-Nosode D13 1 g.

Pagalbinės medžiagos: išgrynintas vanduo, dinatrio fosfatas dihidratas, natrio chloridas, natrio-divandenilio fosfatas dihidratas, benzalkonio chloridas.

Terapinės indikacijos

Slogos simptomų lengvinimas ir papildomas sinusito gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 6 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia purkšti į kiekvieną šnervę 3–5 kartus per dieną – po 1–2 įpurškimus.

2–5 metų vaikams: 3–4 kartus per dieną – po 1 įpurškimą.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams nosies purškalo (tirpalo) vartoti nerekomenduojama.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Euphorbium compositum S* nosies purškalo (tirpalo) medžiagai, ypač benzalkonio chloridui.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Konservantas – 0,01 % benzalkonio chloridas. Labai retai (mažiau nei 1 iš 10 000 vartotojų) jis gali sukelti nosies gleivinės dirginimą.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (< 1/10 000) gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Labai retais atvejais (< 1/10 000) į astmą linkusiems pacientams dėl benzalkonio chlorido gali atsirasti bronchų spazmas. Tokiu atveju pacientams patariama preparato vartojimą nutraukti ir konsultuotis su gydytoju.

Labai retais atvejais (< 1/10 000) *Euphorbium compositum S* nosies purškalas (tirpalas) gali sukelti nosies gleivinės dirginimą, susijusį su deginimu ir nosies sekrecijos padidėjimu.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 20 ml tirpalo.



Gastricumeel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Argentum nitricum D6 30 mg, Acidum arsenicosum D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4 60 mg, Strychnos nux-vomica D4 60 mg, Carbo vegetabilis D6 60 mg, Stibium sulfuratum nigrum D6 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: magnio stearatas, laktozė monohidratas.

Terapinės indikacijos

Skrandžio uždegimo gydymas, rėmens, pilvo pūtimo mažinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 12 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.

Dozavimas vaikams

Amžiaus grupė	Įprastinė dozė	Dozavimas ūminiais atvejais
0–12 mėnesių kūdikiai	Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 2 kartus per dieną.	Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 8 kartų per dieną. Pusę tabletės sutrinti, ištirpinti vandenyje ir sugirdyti.
1–5 metų vaikai	Vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.	Vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 12 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
6–11 metų vaikai	Vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.	Vartoti po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 8 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
12 metų ir vyresni vaikai	Dozuoti taip, kaip suaugusiems žmonėms.	Dozuoti taip, kaip suaugusiems žmonėms.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Gastricumeel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparate yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Gripp-Heel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Aconitum napellus D4 120 mg, Bryonia D4 60 mg, Lachesis mutus D12 60 mg, Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Phosphorus D5 30 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Virusinės peršalimo ligos gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3–5 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Gripp-Heel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Jei simptomai nepraeina, atsiranda dusulys, pūlingų skreplių, karščiavimas ar skausmas kvėpavimo metu, turi konsultuoti gydytojas.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Hepeel® tabletės

Sudėtis. 1 tableteje yra veikliųjų medžiagų: *Lycopodium clavatum* D3 30 mg, *Chelidonium majus* D4 30 mg, *Cinchona pubescens* D3 30 mg, *Myristica fragrans* D4 30 mg, *Silybum marianum* D2 15 mg, *Phosphorus* D6 15 mg, *Veratrum album* D6 60 mg, *Citrullus colocynthis* D6 90 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Papildomas kepenų funkcijos sutrikimų gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Jaunesniems nei 12 metų vaikams be gydytojo patarimo šio vaistinio preparato vartoti negalima.

Gydymo trukmė priklauso nuo pirminės ligos ir paciento ligos istorijos. Trukmę turi nustatyti gydantis gydytojas. Paprastai gydymas trunka 1–2 mėnesius.

Pastaba. Vaisto vartojant ilgiau nei 4 savaites, reikia sekti kepenų funkcijos rodmenis.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas arba tikrajam margainiui (*Silybum marianum*), arba kitiems astrinių (graižaižiedžių) šeimos augalams, arba chininui.

Sergant arba sirgus kepenų liga arba vartojant hepatotoksinių medžiagų, prieš *Hepeel* tablečių vartojimą būtina pasitarti su gydytoju.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Pavartojus vaistų, kuriuose yra chinino, retais atvejais gali kilti padidėjusio jautrumo reakcijų, tokių kaip odos alergija ar karščiavimas. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją.

Pastaba. Gali pasireikšti sensibilizacija (įjautrinimas) chininui ar chinidinui.

Gydant vaistais, kuriuose yra ugniažolės alkaloidų, pavieniais atvejais padidėjo kepenų fermentų (transaminazių) kiekis kraujyje ir bilirubino kiekis kraujyje, pasireiškė net vaistų sukeliamas gelta (nuo vaistų poveikio priklausomas toksinis hepatitas). Šie pokyčiai susilpnėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.





Ignatia-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g. Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ignatia-Homaccord saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Ignatia-Homaccord* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kadangi *Ignatia-Homaccord* vartojimas pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Ypsiloheel®N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Asa foetida D4 30 mg, Strychnos ignatii D4 30 mg, Paris quadrifolia D4 30 mg, Thuja occidentalis D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4 45 mg, Lachesis mutus D8 45 mg, Nitroglycerinum D6 45 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).


Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Ypsiloheel N* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.





Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusių limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Lymphomyosot* geriamųjų lašų medžiagai.

Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Mercurius-Heel® S tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Mercurius solubilis Hahnemanni D10 90 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Lachesis mutus D12 30 mg, Phytolacca americana D4 30 mg, Ailanthus altissima D3 30 mg, Echinacea angustifolia D3 30 mg, Atropa bella-donna D4 60 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Odos ligų, susijusių su uždegimu arba pūliavimu (pvz., šunvočių ar piktvočių), bei tonzilių uždegimo ar supūliavimo papildomas gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei medžiagai, arba astrinių (graižaziedžių) šeimos augalams.

Apskritai ežiulių (*Echinacea*) negalima vartoti žmonėms, sergantiems progresuojančiomis sisteminėmis ligomis, pvz., tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, su uždegimu susijusia jungiamojo audinio liga (kolagenine liga), autoimuninėmis ligomis, išsėtine skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukelta liga arba kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Gydant kitokiais preparatais, kuriuose yra ežiulių (*Echinacea*) ekstrakto, buvo odos išbėrimo ir niežėjimo, retai – veido patinimo, kvėpavimo pasunkėjimo (dusulio), galvos svaigimo ir kraujospūdžio sumažėjimo atvejų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Naso-Heel® SN geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Arum maculatum D4 5 g, Melilotus officinalis D3 5 g, Vinca minor D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Ammonium carbonicum D3 5 g, Lemna minor D3 5 g, Hydrargyrum sulfuratam rubrum D8 10 g, Lobaria pulmonaria D4 10 g, Hydrastis canadensis D4 10 g, Phosphorus D6 10 g, Kalium bichromicum D5 10 g, Hydrargyrum biiodatum D8 5 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Ūminės ar lėtinės slogos bei ūminio ar lėtinio sinusito gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas chromui, bet kuriai veikliajai arba pagalbinei *Naso-Heel SN* geriamųjų lašų medžiagai.

Vaistiniame preparate yra sudedamoji dalis, kurioje yra jodo. Pacientams, kurių skydliaukės veikla sutrikusi ir sumažėjęs jodo toleravimas, šio preparato galima vartoti tik gydytojo patarimu.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Naso-Heel SN geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Pavartojus šio preparato, labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti odos reakcijų arba padidėti seilėtekis. Tokiu atveju reikia pasitarti su gydytoju.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Nervoheel® N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum isovalerianicum D4 30 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną.

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. *Nervoheel N* tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso *Nervoheel N* tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl *Sepia*, kuri yra tamsios spalvos. Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas.

Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Neurexan® tabletės

Sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną.

Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze.

Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Vartojimas vaikams. *Neurexan* negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų).

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 50 tablečių.



Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g, Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g. Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Lengvų skrandžio, žarnų ar kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Nux vomica-Homaccord* geriamųjų lašų medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.





Phosphor-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Phosphorus D10 0,4 g, Phosphorus D30 0,4 g, Phosphorus D200 0,4 g, Argentum nitricum D10 0,3 g, Argentum nitricum D30 0,3 g, Argentum nitricum D200 0,3 g, Paris quadrifolia D6 0,3 g, Paris quadrifolia D10 0,3 g, Paris quadrifolia D30 0,3 g, Paris quadrifolia D200 0,3 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Laringito ar faringito (gerklų ar ryklės uždegimo) sukkelto užkimimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: gerti po 3 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 3 lašus kas 15 min.

2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei *Phosphor-Homaccord* geriamųjų lašų medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Spascupreel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Citrullus colocynthis D4 30 mg, Ammonium bromatum D4 30 mg, Atropinum sulfuricum D6 30 mg, Veratrum album D6 30 mg, Magnesium phosphoricum D6 30 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Passiflora incarnata D2 15 mg, Amanita muscaria D4 15 mg, Matricaria recutita D3 15 mg, Cuprum sulfuricum D6 15 mg, Aconitum napellus D6 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmų sukeltų simptomų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., vaistinei ramunei (*Matricaria recutita*), ar kitiems graižaziedžių (astrinių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei *Spascupreel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparatė yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Specialių atsargumo priemonių reikia, jei yra tulžies akmenų, tulžies latakų užsikimšimas ar gelta.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti alerginių reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Viburcol® žvakutės

Sudėtis. Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, Atropa belladonna D2 1,1 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg, Plantago major D3 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg. Pagalbinė medžiaga yra kietieji riebalai.

Terapinės indikacijos

Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalvimų kalantis dantims ir ausų skausmo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Įprastinis dozavimas ir dozavimas ūminiais atvejais

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 3 kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams žvakutes rekomenduojama vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitiems graižažiedžiu (astrinių) šeimos augalams.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei kūno temperatūra didesnė kaip 39 °C arba simptomai pasunkėja ar per 4 dienas nepalengvėja, būtina gydytojo konsultacija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Retais atvejais gali atsirasti alerginių odos reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 12 žvakučių.



Viburcol®

Moderni
homeopatinė
alternatyva

**Esant
karščiavimui,
neramumui,
kai sunkiai dygsta dantys,
ausų skausmui lengvinti**

Tinkamas nuo pat kūdikystės



Viburcol® žvakutės • Homeopatinis vaistinis preparatas

Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, Atropa belladonna D2 1,1 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg, Plantago major D3 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg.

Terapinės indikacijos. Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalavimų kalantis dantims ir ausų skausmo lengvinimas. Tai vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprastinis dozavimas ir dozavimas ūminiais atvejais. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 3 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per dieną. Jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams žvakutes rekomenduojama vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitiems graižaziedžių (astrinių) šeimos augalams. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Jei kūno temperatūra didesnė kaip 39 °C arba simptomai pasunkėja ar per 4 dienas nepalengvėja, būtina gydytojo konsultacija. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Nežinoma. **Nepageidaujamas poveikis.** Retais atvejais gali atsirasti alerginių odos reakcijų. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 12 žvakučių. Nereceptinis vaistinis preparatas. **Rinkodaros teisės turėtojas.** Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Įgaliotasis atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. **Teksto peržiūros data.** 2011-06-15

DistributionPartner
-Heel
Healthcare designed by nature

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Detox-Kit

Organizmą detoksikuojantis
homeopatinis preparatų rinkinys

Efektyvu
Toleruojama
Paprasta vartoti

Lymphomyosot® geriamieji lašai
aktyvina limfinę sistemą, detoksikuoja jungiamąjį audinį ir mezenchimą.

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai
aktyvina skrandžio ir žarnyno sistemų ekskreciją, kepenų veiklą.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai
aktyvina urogenitalinės bei tulžies sistemų veiklą.

- Aktyvina žalingas medžiagas (toksinus) šalinančias organizmo sistemas – limfinę, virškinamojo trakto, kepenų, inkstų, tulžies.
- Tinka vartoti sergant lėtinėmis ir alerginėmis ligomis, gyvenant užterštoje aplinkoje, kai yra bloga bendra sveikatos būklė.
- Sergant peršalimo ligomis ir gripu iš organizmo greičiau šalinami virusai ir bakterijos.

Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Leucisrum scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levosthroanium D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferum iodatum D12 10 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų.
Terapinės indikacijos. Dėl lėtinio tonzilių pasireiškusių limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralių limfos nutekėjimą. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis vaikams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai. Nepasitauso su gydytoju, nevaroti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-05-18

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g, Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų. **Terapinės indikacijos.** Lengvų skrandžio, žarnų ir kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo putimo gydymas. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas divi valandos) po 10 lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas divi valandos) po 5 lašus kas 15 min. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas divi valandos) po 7 lašus kas 15 min. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Ilgalaikį (keilų mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei Nux vomica-Homaccord geriamųjų lašų medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Nežinomas. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-10-12

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g geriamųjų lašų (104 ml) yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų. **Terapinės indikacijos.** Šlapimo takų uždegimo gydymas. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Jaunesniems nei 12 metų, nebūvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-07-25



Gydymo trukmė. Detox-Kit® sudėtyje esantys visi 3 preparatai turi būti vartojami tokiu pačiu laiku mažiausiai 3 savaites.

Dozavimas. Kiekvieno preparato vartoti po 10 lašų 3 kartus per dieną.

Vartojimas. Įlašinti kiekvieno preparato po 30 lašų į 0,7–1,5 l vandens (geriau mineralinio, neprisotinto angliavandens) butelį, sumaišyti pavartant ir išgerti per dieną.

Vieno Detox-Kit® rinkinio užtenka 3 savaitėms.

Nereceptiniai vaistiniai preparatai.

Rinkodaros teisės turetojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Įgaliojatis atstovaus.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Distribution Partner
-Heel-
Healthcare designed by nature