



Apie virškinimo ir kraujotakos sutrikimus, galvos svaigimą

Gydytojo homeopato požiūris

6 knyga



sveikos gyvensenos
akademi ja

Kodėl parašėme šią knygą Jums?

Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į ligą ir jos gydymą. Jei skauda ranką – išgeriame vaistų *nuo skausmo*, jei pakilo temperatūra – pavartojame vaistų *nuo temperatūros*. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip simptomų slopinimas. O ligos priežastis yra kita, tad ir temperatūra pakilo dėl tam tikros priežasties, o ir ranką skauda taip pat dėl konkrečios priežasties. Temperatūra – tai ligos simptomas, skausmas – taip pat ligos simptomas. Šiuolaikinė homeopatija kelia klausimus – *kodėl prasidėjo liga?* kokia yra atsiradusio simptomo priežastis? – ir veikia būtent tą priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gydytis, todėl homeopatiniais preparatais simptomas yra valdomas ir taip skatinama organizmo savireguliacija. Šiuolaikinio homeopatinio gydymo esmė – gydyti ligonį, o ne ligą.

Šiandien, kai žmonės visame pasaulyje serga vis sudėtingesnėmis ligomis, kai kas antras vaikas gimsta jau būdamas alergiškas, daugėja onkologinių ligų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, būtina kalbėti apie tai, kodėl reikia skleisti šį naują požiūrį į mediciną, nes šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo sistema, **turinti kitokį požiūrį į ligą nei įprastinis gydymas. Homeopatija ieško ligos priežasties, veikia tą priežastį ir taip padeda pasveikti.**

Tad šiandien galime drąsiai teigti, kad šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo metodas, dažniausiai neturintis šalutinio poveikio ir orientuotas į priežasties šalinimą, paskatindamas organizmo bioreguliacinius procesus. Plačiau skaitykite www.siuolaikinehomeopatija.lt.



Virškinimo ligos

Sveikata prasideda nuo žarnyno. Iš tiesų, žarnyno būklė daro didžiulę įtaką mūsų sveikatai ir savijautai. Jeigu palaikysime žarnyną švarų ir sveiką, tikėtina, kad išvengsime daugelio ligų. Tačiau šiuolaikinis žmogus dažniausiai, kol yra sveikas, apie tai nesusimąsto ir kenkia virškinimo sistemai.

Kaltas ne tik maistas?

Pastaruoju metu besiskundžiančiųjų virškinimo sutrikimais daugėja. Visų pirma, dėl netinkamos mitybos. Netaisyklinga mityba, nepakankamas skysčių kiekis neigiamai atsiliepia žarnynui. Tačiau ne vien maistas ir mitybos įpročiai lemia virškinimo sutrikimus. Didelę įtaką sveikatos sutrikimų atsiradimui turi ir daugelis kitų civilizacijos nulemtų veiksnių, pvz., mažas fizinis aktyvumas. Šiuolaikinis žmogus dienų dienas sėdi darbe, prie kompiuterio, televizoriaus ir pan. Stresas, įtampa – neatsiejami šių dienų palydovai. Streso metu rūgštingumas virškinimo trakte gali padidėti net dešimtį kartų ir paskatinti skrandžio ligų arba nemalonių pojūčių, rėmens graužimo atsiradimą. Kitas svarbus virškinimo sistemos ligų rizikos veiksnys – poilsio stoka. Medikai teigia, kad keletą metų be atostogų dirbančiam žmogui neišvengiamai pasireikš virškinimo sutrikimų. Taip pat virškinimo sistemos ligų išsivystymą gali paskatinti rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu, kt.

Dažniausi negalavimai – skrandžio uždegimas, rėmuo, nevirškinimo jausmas, pilvo pūtimas

Rėmuo, statistikos duomenimis, kasdien vargina kas dešimtą žmogų. Nerimą kelia ne tik tai, kad per pastaruosius metus žmonių, kuriuos kamuoja rėmuo, skaičius smarkiai padidėjo, bet ir tai, kad vis dažniau diagnozuojamos sunkesnės ligos formos ir kad daugėja sergančių vaikų ir paauglių. Rėmuo ima varginti, kai skrandžio rūgštis patenka į stemplę, tada žmogus skundžiasi deginimo, sunkumo pojūčiu skrandyje.

Itin nemalonus, keliantis diskomfortą yra pilvo pūtimas. Šis negalavimas gali atsirasti dėl to, kad valgant priryjama oro, o taip gali nutikti, jei valgio metu kalbama, geriama, taip pat daug suvalgius angliavandenių ar skaidulų turinčio maisto. Tačiau ne vien maistas sukelia pilvo pūtimą, didelę reikšmę turi ilgalaikis sėdimas darbas, per mažas aktyvumas, stresinės situacijos, dėl ko sutrinka žarnyno motorika. Pilvo pūtimu gali pasireikšti dirgliosios žarnos sindromas arba funkcinė dispepsija, kai organinių pakitimų nerandama.

Gastritas – tai skrandžio gleivinės uždegimas, dėl kurio ji paburksta, parausta, sunkesniais atvejais gali atsirasti žaizdų. Sergantis gastritu žmogus gali skųstis pilnumo jausmu skrandyje, pilvo skausmais, pykinimu, vėmimu.

Kada kreiptis į medikus?

Rėmuo, pilvo skausmas, pūtimas ar kiti virškinimo negalavimai žinomi kiekvienam. Kada reikėtų susirūpinti ir kreiptis į medikus? Medikų teigimu, jeigu negalavimas pasireiškia trumpą laiką ir nesutrikdo gyvenimo kokybės, į gydytoją galima ir nesikreipti. Tačiau jeigu simptomai vargina kasdien, trunka po kelias valandas, jeigu žmogus ima galvoti apie ligą, rinktis maistą ar išvis nustoja valgyti kai kuriuos produktus, būtina pasitarti su specialistu.





Dažniausiai užduodami klausimai apie virškinimo ligas, kraujotakos sutrikimus, galvos svaigimą ir homeopatiją

Kalbamės su gydytoja homeopate **Edita JASKELEVIČIENE**.

Ką galite patarti, kai dažnai po valgio graužia rėmuo?

Efektyvus preparatas nuo rėmens graužimo jausmo yra *Gastricumeel* tabletės. Rekomenduojama papildomai vartoti detoksikuojančių vaistų rinkinį (*Nux vomica-Homaccord* geriamieji lašai, *Berberis-Homaccord* geriamieji lašai, *Lymphomyosot* geriamieji lašai).

Svarbu valgomo maisto suderinamumas ir emocinė būklė.

Ką galėtumėte rekomenduoti mano vaikui? Jis yra nevalgius, dažnai serga peršalimo ligomis?

Jūsų vaikui reikia padėti suaktyvinti organizmo išsivalymo procesus ir pagerinti virškinimą. Tai padės detoksikuojančių vaistų rinkinys. Į šį rinkinį įeinantys vaistiniai preparatai suaktyvina pagrindinių organizmo detoksikacinių sistemų darbą: *Nux vomica-Homaccord* geriamieji lašai suaktyvina virškinimo trakto veiklą ir kepenų detoksikaciją, *Lymphomyosot* geriamieji lašai veikia limfinę sistemą, o *Berberis-Homaccord* geriamieji lašai padeda efektyviai dirbti inkstų ir šlapimo sistema, suaktyvina tulžies pūslės veiklą, kepenų išsivalymą. Tai jau ir imuniteto stiprinimo pradžia, nes 80 proc. vietinio imuniteto nulemia žarnynas. Sergant peršalimo ligomis reikia vartoti *Engystol* tabletes ar *Echinacea compositum Cosmoplex* tabletes.

Ką galite patarti pavartoti iš homeopatinėjų vaistų po persirgto hepatito?

Persirgus hepatitu svarbu organizmą detoksikuoti homeopatinėjų vaistų rinkiniu (kurį sudaro minėtieji geriamieji lašai: *Nux vomica-Homaccord*, *Berberis-Homaccord*, *Lymphomyosot*) ir kuo mažiau apkrauti vaistais, nes kepenys – pagrindinis organizmo valymo organas. Todėl šiuo atveju tinka homeopatija. Efektyvi pagalba kepenims yra *Hepeel* tabletės. Efektyvu *Hepeel* tabletes vartoti su minėtu detoksikuojančių homeopatinėjų vaistų rinkiniu.

Ką galima vartoti nėštumo metu nuo pykinimo?

Nėštumo metu padeda *Nux vomica-Homaccord* geriamieji lašai, kurie suaktyvina virškinimo trakto veiklą, padeda, kai pykina, yra nevirškinimo jausmas, šleikštulys.

Todėl nėščioji drašiai gali vartoti šį preparatą. Galima vartoti nėštumo metu ir visą detoksikuojančių vaistų rinkinį (geriamuosius lašus: *Nux vomica-Homaccord*, *Berberis-Homaccord*, *Lymphomyosot*).

Kokios homeopatijos galimybės esant virškinimo sistemos sutrikimams?

Esant virškinimo sistemos sutrikimams efektyviai ir saugiai padeda homeopatija. Skiriama tokia gydymo schema: detoksikuojantis vaistų rinkinys (geriamieji lašai: *Nux vomica-Homaccord*, *Berberis-Homaccord*, *Lymphomyosot*); *Gastricumeel* tabletės – esant skrandžio sutrikimams ir rėmens graužimui; *Spascupreel* tabletės – kai vargina spazminiai skausmai. Esant dažniems virškinimo sutrikimams, būtina suprasti, ko žmogus „negali suvirškinti“ savo gyvenime. Gal tai įtempti santykiai šeimoje, darbovietėje ar vaikui sunku prisitaikyti darželyje arba mokykloje? Todėl, daugeliu atvejų, esant virškinimo sistemos sutrikimams rekomenduojama kartu pavartoti ir nervų sistemą stiprinančių homeopatinį vaistų: *Neurexan* tablečių, *Nervoheel N* tablečių ar *Ypsiloheel N* tablečių, taip pat *Ignatia-Homaccord* geriamųjų lašų.

Esu studentė, dideli mokslo krūviai, todėl dažnai pykina. Ypač pykinimas ir pilvo spazmai pasireiškia prieš egzaminus. Kokie homeopatiniai vaistai galėtų padėti?

Jūsų atveju efektyvi pagalba – *Nux vomica-Homaccord* geriamieji lašai, kurie suaktyvina virškinimo trakto veiklą, padeda esant tokiems simptomams, kaip pykinimas, nevirškinimo jausmas, šleikštulys. Jei vargina pilvo spazmai, derinkite su *Spascupreel* tabletėmis, tai vaistas virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmams lengvinti. Prieš egzaminą rekomenduojama pavartoti *Neurexan* tabletes, jos pagerins koncentraciją ir įsiminimo procesus, nes pašalins nerimą. Būtinai ir atsipalaidavimo ar grūdinimosi priemonės, tokios kaip pirtis, baseinas, kvėpavimo praktika.

Ką patartumėt 4-erių metų vaikeliui, kuris dažnai skundžiasi pilvuko skausmais?

Efektyvi ir saugi priemonė bet kokio amžiaus vaikams nuo pilvo spazmų yra *Spascupreel* tabletės. Tai preparatas virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmams lengvinti. Efektyvu derinti su *Viburcol* žvakutėmis, kai vargina neramumas.

Ką patartumėte, kai vargina raugėjimas ir pilnumo pojūtis viršutinėje pilvo dalyje?

Varginant tokiems simptomams, reikia vartoti *Chelidonium-Homaccord N* geriamuosius lašus.



Jau daug metų kamuoja rėmens graužimas, ką patartumėte vartoti jam sumažinti?

Šiais laikais rėmens graužimas vargina daugelį žmonių. Esant tokiems simptomams reikia vartoti *Gastricumeel* tabletes. Šis vaistas puikiai padeda gydant gastritą. Žmonėms, kuriuos vargina meteorizmas, šis vaistas taip pat puikiai tinka.

Ką patartumėt iš natūralių priemonių, kai vargina skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku, kartumo jausmas burnoje?

Skausmai po dešiniuoju šonkaulių lanku, kartumo jausmas burnoje dažniausia yra susiję su kepenų funkcijos sutrikimais. Tokiu atveju tikslinga vartoti *Hepeel* tabletes – tai vaistas, kuris gerina kepenų veiklą.

Mane vargina pilvo pūtimas, maudimas po kairiuoju šonkaulių lanku ir dažnas tuštinimasis. Kas galėtų pagelbėti?

Dažnas pilvo pūtimas, maudimas po kairiuoju šonkaulių lanku gali būti susijęs su kasos disfunkcija. Jei pacientai dar jaučia juosiantį skausmą, tai yra didelė tikimybė, kad tai kasos funkcijos sutrikimai. Reiktų atlikti echoskopiją ir kitus tyrimus. Šiuo atveju tikslinga vartoti *Leptandra compositum* geriamuosius lašus, kurie pagerintų kasos veiklą ir pašalintų šiuos sutrikimus.

Ką galite rekomenduoti pavartoti esant nervinės kilmės maudimui širdies plote?

Esant širdies negalavimams, tikslinga kreiptis į gydytoją ir atlikti elektrokardiogramą. *Cralonin* geriamieji lašai – puikus vaistas esant juntamiems širdies plakimams ir neurogeniniams širdies veiklos sutrikimams. Šis preparatas rekomenduojamas ir vyresnio amžiaus žmonėms, kai atsiranda senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių sukeltiems simptomams lengvinti.

Mano sūnui 27 metai. Jam po įtemptų situacijų ar po streso pasireiškia dažnesnis širdies plakimas. Ką galėtumėt patarti iš homeopatinių vaistų?

Cralonin geriamieji lašai efektyvūs, esant simptomams širdies plote ir padažnėjusiam širdies plakimui, pasireiškusiems po streso ar nervinės įtampos. Todėl ir jauno amžiaus pacientams, pasireiškus širdies plakimui, efektyvu pavartoti *Cralonin*. Esant stresui, *Cralonin* geriamuosius lašus reiktų derinti kartu ir nervų sistemą stiprinančiu vaistu – *Neurexan* tabletėmis.

Mano mamą vargina širdies nepakankamumo simptomai, ji vartoja cheminius vaistus. Ar gali kartu vartoti homeopatinių širdies preparatų?

Taip, homeopatiją su paskirtais cheminiais širdies vaistais derinti galima. Vaistą

Cralonin tikslinga vartoti, kai pasireiškia senatviniai širdies pakitimai, taip pat širdies raumens pažeidimo padarinių sukeltiems simptomams lengvinti.

Ką patartumėte pavartoti esant galvos svaigimui?

Esant svaigimo simptomui, efektyvus vaistas – *Vertigoheel* tabletės. Jis rekomenduojamas esant įvairių priežasčių sukeltam svaigimui.

Patyriau galvos traumą ir yra liekamųjų galvos svaigimo reiškinių. Ar yra homeopatinis vaistas, galintis padėti?

Esant galvos svaigimui po traumos tikslinga vartoti *Vertigoheel* tabletes. Vartojimo kursas – 3–6 mėnesiai. Kartu galima derinti su *Traumeel S* tabletėmis.

Ką patartumėte vartoti po insulto, likus koordinacijos sutrikimams ir galvos svaigimui?

Šiuo atveju galvos kraujotakai gerinti tinka *Vertigoheel* tabletės. *Vertigoheel* – efektyvi prevencinė priemonė žmonėms vyresniame amžiuje smegenų kraujotakai gerinti esant (arba ne) svaigimui.

Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt



Homeopatiniai vaistiniai preparatai

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Šlapimo takų uždegimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.

Pastaba. Ilgalaikį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei *Berberis-Homaccord* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Chelidonium-Homaccord® N geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Chelidonium majus D10 0,6 g, Chelidonium majus D30 0,6 g, Chelidonium majus D200 0,6 g, Atropa belladonna D10 0,3 g, Atropa bella-donna D30 0,3 g, Atropa bella-donna D200 0,3 g, Atropa bella-donna D1000 0,3 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Dujų susikaupimo virškinimo trakte, raugėjimo, atpylimo ar pilnumo pojūčio viršutinėje pilvo dalyje lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną, ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Chelidonium-Homaccord N saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, neiširti. Duomenų nėra.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniaisiais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Dėl sudedamosios dalies ugniažolės (*Chelidonium*) nėštumo ir žindymo laikotarpiu *Chelidonium-Homaccord N* vartoti negalima.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Buteliuke yra 30 ml tirpalo.





Cralonin® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 70 ml, Spigelia anthemia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeninių širdies veiklos sutrikimų sukeltų simptomų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Vaisto dozavimą gydytojas turi nustatyti atsižvelgdamas į paciento būklę.

Suaugusiems žmonėms: gydant ilgai įprastinis dozavimas – po 10–20 lašų 3 kartus per parą, ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 15 min., bet ne daugiau kaip 12 kartų per parą.

Perspėjimas. Tokių dozių ilgai be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Cralonin geriamųjų lašų netinka vartoti vaikams.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Cralonin* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 178 mg 10 lašų dozėje (atitinka 4,5 ml alaus, 1,88 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – tūrio 12 % etanolio, arba 59,84 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindydėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Nepasitarus su gydytoju, preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems širdies veiklos nepakankamumu. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų gydytojo skirtų vaistų.

Kritinės būklės atveju, jei pacientas ima dusti (trūksta oro) arba atsiranda krūtinės skausmas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę pilvo dalį arba kaklą, arba jei simptomai yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėjusiu prakaitavimu ir per pusvalandį nesumažėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Pavieniais atvejais iš pradžių homeopatinis preparatas gali sukelti laikiną būklės pablogėjimą, kuris pasireiškia trumpalaikiu veido odos paraudimu, tachikardija (pagreitėjusiu širdies plakimu) ir padažnėjusiu pulsą, edemų atsiradimu, galvos svaigimu, pykinimu ir nedideliais skrandžio funkcijos sutrikimais.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Echinacea compositum Cosmoplex® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Echinacea D2 0,9 mg, Lachesis mutus D10 0,3 mg, Hepar sulfuris D8 0,3 mg, Phytolacca americana D4 0,3 mg, Thuja occidentalis D4 0,3 mg, Bryonia D4 0,3 mg, Matricaria recutita D6 0,3 mg, Rhus toxicodendron D4 0,3 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nosiaryklės gleivinės uždegimo (pvz., rinito, sinusito, tonzilito, faringito arba laringito) pagalbinis gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: ūminiais atvejais vartoti po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (neviršyti 12 tablečių per dieną), lėtiniais atvejais – po 1 tabletę 1–3 kartus per dieną.

Echinacea compositum Cosmoplex tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, neiširti, todėl vaisto tokio amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama.

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas vaistinei ramunei (*Matricaria recutita*) ir kitiems astrinių (graizažiedžių) šeimos augalams, nuodingajam žagreniui, bet kuriai kitai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais (<1/10 000), kelių parų laikotarpiu nuo vaistinio preparato vartojimo pradžios ir (arba) po vartojimo nutraukimo, gali atsirasti virškinimo trakto sutrikimų ar odos reakcijų.

Labai retais atvejais (<1/10 000) gali atsirasti alerginių odos reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.





Engystol® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Vincetoxicum hirundinaria D6 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 mg, Vincetoxicum hirundinaria D30 75 mg, Sulfur D4 37,5 mg, Sulfur D10 37,5 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Peršalimo, ypač susijusio su virusine infekcija, gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps), ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

6–11 metų vaikams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. (iki 8 kartų per dieną).

1–5 metų vaikams: pasitarus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, ūminiais atvejais – po 0,5 tabletės kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Engystol* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Vartojant *Engystol* tablečių, pavieniais atvejais gali išberti odą. Tokiu atveju vaisto vartojimą reikia nutraukti ir kreiptis į gydytoją.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Gastricumeel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Argentum nitricum D6 30 mg, Acidum arsenicosum D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4 60 mg, Strychnos nux-vomica D4 60 mg, Carbo vegetabilis D6 60 mg, Stibium sulfuratum nigrum D6 60 mg.
Pagalbinės medžiagos: magnio stearatas, laktozė monohidratas.

Terapinės indikacijos

Skrandžio uždegimo gydymas, rėmens, pilvo pūtimo mažinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 12 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.

Dozavimas vaikams

Amžiaus grupė	Įprastinė dozė	Dozavimas ūminiais atvejais
0–12 mėnesių kūdikiai	Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės 2 kartus per dieną.	Pasikonsultavus su gydytoju, vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 8 kartų per dieną. Pusę tabletės sutrinti, ištirpinti vandenyje ir sugirdyti.
1–5 metų vaikai	Vartoti po 0,5 tabletės 3 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.	Vartoti po 0,5 tabletės kas 1–2 val. iki 12 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
6–11 metų vaikai	Vartoti po 1 tabletę 2 kartus per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.	Vartoti po 1 tabletę kas 1–2 val. iki 8 kartų per dieną, lėtai ištirpinant burnoje.
12 metų ir vyresni vaikai	Dozuoti taip, kaip suaugusiems žmonėms.	Dozuoti taip, kaip suaugusiems žmonėms.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Gastricumeel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparate yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Hepeel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: *Lycopodium clavatum* D3 30 mg, *Chelidonium majus* D4 30 mg, *Cinchona pubescens* D3 30 mg, *Myristica fragrans* D4 30 mg, *Silybum marianum* D2 15 mg, *Phosphorus* D6 15 mg, *Veratrum album* D6 60 mg, *Citrullus colocynthis* D6 90 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Papildomas kepenų funkcijos sutrikimų gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Jaunesniems nei 12 metų vaikams be gydytojo patarimo šio vaistinio preparato vartoti negalima.

Gydymo trukmė priklauso nuo pirminės ligos ir paciento ligos istorijos. Trukmę turi nustatyti gydantis gydytojas. Paprastai gydymas trunka 1–2 mėnesius.

Pastaba. Vaisto vartojant ilgiau nei 4 savaites, reikia sekti kepenų funkcijos rodmenis.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas arba tikrajam margainiui (*Silybum marianum*), arba kitiems astrinių (graižaziedžių) šeimos augalams, arba chininui.

Sergant arba sirgus kepenų liga arba vartojant hepatotoksinių medžiagų, prieš *Hepeel* tablečių vartojimą būtina pasitarti su gydytoju.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Dėl sudedamųjų dalių ugniažolės (*Chelidonium*) ir čemerio (*Veratrum*) negalima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Šalutinis poveikis. Pavartojus vaistų, kuriuose yra chinino, retais atvejais gali kilti padidėjusio jautrumo reakcijų, tokių kaip odos alergija ar karščiavimas. Tokiu atveju reikia kreiptis į gydytoją.

Pastaba. Gali pasireikšti sensibilizacija (įjautrinimas) chininui ar chinidinui.

Gydant vaistais, kuriuose yra ugniažolės alkaloidų, pavieniais atvejais padidėjo kepenų fermentų (transaminazių) kiekis kraujyje ir bilirubino kiekis kraujyje, pasireiškė net vaistų sukeliama gelta (nuo vaistų poveikio priklausomas toksinis hepatitas). Šie pokyčiai susilpnėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Ignatia-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g. Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ignatia-Homaccord saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Ignatia-Homaccord* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kadangi *Ignatia-Homaccord* vartojimas pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.


Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Ypsiloheel®N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: *Asa foetida* D4 30 mg, *Strychnos ignatii* D4 30 mg, *Paris quadrifolia* D4 30 mg, *Thuja occidentalis* D6 30 mg, *Pulsatilla pratensis* D4 45 mg, *Lachesis mutus* D8 45 mg, Nitroglycerinum D6 45 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).


Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Ypsiloheel N* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Leptandra compositum geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g geriamųjų lašų, tirpalo yra Leptandra D2 1 g, Quassia amara D3 1 g, Podophyllum peltatum D3 1 g, Arsenicum album D4 1 g, Carbo vegetabilis D10 1 g, Niccolum metallicum D10 1 g, Phosphorus D6 1 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis, išgrynintas vanduo.

Preparato grupė

Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų.

Nurodymai

Prieš vartojimą pasitarkite su gydytoju homeopatu.

Jei simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Jei nepaskirta kitaip, gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Jei liga ūminė, pradžioje (pirmas 2 valandas) gerti po 10 lašų kas 15 min.

Kontraindikacijos. Nėštumo ir žindymo laikotarpis.

Ypatingi įspėjimai. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150 mg dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1 ml vyno). Kenksmingas sergantiems alkoholizmu. Būtina atsizvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir didelės rizikos grupės (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija) pacientams.

Sąveika su kitais preparatais. Nepastebėta.

Šalutinis poveikis. Nepastebėtas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Buteliuke yra 30 ml tirpalo.





Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusių limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Lymphomyosot* geriamųjų lašų medžiagai.

Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skyd liaukės ligomis.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Nervoheel® N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum isovalerianicum D4 30 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną.

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. *Nervoheel N* tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso *Nervoheel N* tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl *Sepia*, kuri yra tamsios spalvos. Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas.

Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Neurexan® tabletės

Sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną.

Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze.

Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Vartojimas vaikams. *Neurexan* negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų).

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 50 tablečių.



Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g, Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g. Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Lengvų skrandžio, žarnų ar kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Nux vomica-Homaccord* geriamųjų lašų medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.





Spascupreel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Citrullus colocynthis D4 30 mg, Ammonium bromatum D4 30 mg, Atropinum sulfuricum D6 30 mg, Veratrum album D6 30 mg, Magnesium phosphoricum D6 30 mg, Gelsemium sempervirens D6 30 mg, Passiflora incarnata D2 15 mg, Amanita muscaria D4 15 mg, Matricaria recutita D3 15 mg, Cuprum sulfuricum D6 15 mg, Aconitum napellus D6 60 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Virškinimo organų (skrandžio, žarnyno, tulžies pūslės) spazmų sukeltų simptomų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūminių sutrikimų atvejis – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 1 tabletę kas 15 min.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejis – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejis – pradžioje po 1 tabletę kas 1–2 val. (ne ilgiau kaip dviejų valandų laikotarpiu).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). Vaikams tabletę galima susmulkinti ir įmesti į nedidelį kiekį vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms, pvz., vaistinei raminei (*Matricaria recutita*), ar kitiems graižžiedžių (astrinių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei *Spascupreel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Preparatas yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Specialių atsargumo priemonių reikia, jei yra tulžies akmenų, tulžies latakų užsikimšimas ar gelta.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retas atvejis (<1/10 000) gali atsirasti alerginių reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Traumeel® S tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Arnica montana D2 15 mg, Calendula officinalis D2 15 mg, Hamamelis virginiana D2 15 mg, Achillea millefolium D3 15 mg, Atropa belladonna D4 75 mg, Aconitum napellus D3 30 mg, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 30 mg, Hepar sulfuris D8 30 mg, Chamomilla recutita D3 24 mg, Symphytum officinale D8 24 mg, Bellis perennis D2 6 mg, Echinacea angustifolia D2 6 mg, Echinacea purpurea D2 6 mg, Hypericum perforatum D2 3 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Bukų traumų (pvz., raiščių patempimo, sumušimo, panirimo, mėlynių), kaulų ir sąnarių degeneracijos simptomų gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Dėl nepakankamai dokumentuotos patirties jaunesniems nei 12 metų vaikams Traumeel S tablečių reikėtų vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai medžiagai, pvz., kalninei arnikai (*Arnica montana*), ramunėlei (*Chamomilla*), paprastajai kraujažolei (*Achillea millefolium*), kitiems astrinių (graižožiedžių) šeimos augalams arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Ežiuolių (*Echinacea*) apskritai negalima vartoti žmonėms, sergantiems progresuojančiomis, sisteminėmis ligomis: tuberkulioze, leukemija ar į ją panašiomis ligomis, jungiamojo audinio uždegimu (kolageninėmis ligomis), autoimuninėmis ligomis, išsėtinė skleroze, AIDS, ŽIV infekcijos sukeltomis ir kitokiomis lėtinėmis virusinėmis ligomis.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Traumeel S tabletės, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo arba alerginių odos reakcijų (paraudimas, patinimas ir niežėjimas) žmonėms, jautriems astrinių (graižožiedžių) šeimos augalams (pvz., kalninei arnikai, medetkai, paprastajai kraujažolei). Tokiais atvejais medikamento vartojimas turėtų būti nutrauktas. Odos išbėrimas ir niežėjimas, retais atvejais – veido tinimas, pasunkėjęs kvėpavimas (dusulys), galvos svaigimas ir kraujospūdžio sumažėjimas pasireiškė po gydymo preparatais, kuriuose yra ežiuolių (*Echinacea*) ekstrakto. Pavartojus šio vaisto, gali padidėti seilėtekis. Tokiu atveju medikamento vartojimą reikia nutraukti.

Retkarčiais gali atsirasti alerginių reakcijų dėl homeopatinės veikliosios medžiagos *Mercurius solubilis*.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.





Vertigoheel® tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum D3 30 mg, Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum rectificatum D8 30 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Jei simptomai nepraeina arba pasunkėja, kreipkitės į gydytoją.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje vartoti po 1 tabletę kas 15 min.

Vertigoheel tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Vertigoheel* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 50 tablečių.



Viburcol® žvakutės

Sudėtis. Vienoje žvakutėje yra veikliųjų medžiagų: Chamomilla recutita D1 1,1 mg, Atropa belladonna D2 1,1 mg, Solanum dulcamara D4 1,1 mg, Plantago major D3 1,1 mg, Pulsatilla pratensis D2 2,2 mg, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 mg. Pagalbinė medžiaga yra kietieji riebalai.

Terapinės indikacijos

Pagalbinis karščiavimo gydymas, neramumo gydymas, negalavimų kalantis dantims ir ausų skausmo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Įprastinis dozavimas ir dozavimas ūminiais atvejais

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 4 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 3 kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: kišti į tiesiąją žarną po 1 žvakutę 2 kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 6 mėnesių vaikams žvakutes rekomenduojama vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Padidėjęs jautrumas ramunėlėms ar kitiems graižaziedžiu (astrinių) šeimos augalams.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Jei kūno temperatūra didesnė kaip 39 °C arba simptomai pasunkėja ar per 4 dienas nepalengvėja, būtina gydytojo konsultacija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Retais atvejais gali atsirasti alerginių odos reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 12 žvakučių.



Vertigoheel®

Moderni
homeopatinė
alternatyva

svaigimas



Vertigoheel® tabletės • Homeopatinis vaistinis preparatas

Vienoje tablečiųje yra veikliųjų medžiagų: Anamirta cocculus D4 210 mg, Conium maculatum D3 30 mg, Ambra grisea D6 30 mg, Petroleum rectificatum D8 30 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos. Dėl įvairių priežasčių atsiradęs galvos svaigimas.

Tai vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia vartoti po 3 tabletes 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps). Ūmiai atsiradus galvos svaigimui ir pykinimui, pradžioje vartoti po 1 tablečių kas 15 min. Vertigoheel tablečių saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Vertigoheel tablečių medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Nežinomas. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 50 tablečių. **Nereceptinis vaistinis preparatas.**

Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)

Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt **Teksto peržiūros data.** 2011-05-23

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Distribution Partner

-Heel

Healthcare designed by nature

www.heel.lt

Cralonin®

Moderni
homeopatinė
alternatyva

Funkciniai
širdies negalavimai

- ♥ Esant senatviniams širdies negalavimams
- ♥ Esant nerviniams širdies veiklos sutrikimams
- ♥ Gerai toleruojamas ir daugybę kartų išbandytas

Cralonin® geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 70 ml, Spigelia anthelmia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.

Terapinės indikacijos

Senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeninių širdies veiklos sutrikimų sukeltų simptomų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo metodas. Vaisto dozavimą gydytojas turi nustatyti atsižvelgdamas į paciento būklę. Suaugusiems žmonėms: gydant ilgai įprastinis dozavimas – po 10–20 lašų 3 kartus per parą, ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 15 min., bet ne daugiau kaip 12 kartų per parą. *Perspėjimas.* Tokių dozių ilgai be gydytojo nurodymo vartoti negalima. Cralonin geriamųjų lašų netinka vartoti vaikams.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Cralonin medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 178 mg 10 lašų dozėje (atitinka 4,5 ml alaus, 1,88 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – tūrio 12 % etanolio, arba 59,84 ml obuolių sulčių). Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. Nepsitarus su gydytoju, preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems širdies veiklos nepakankamumu. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų gydytojo skirtų vaistų. Kritinės būklės atveju, jei pacientas ima dusti (trūksta oro) arba atsiranda krūtinės skausmas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę pilvo dalį arba kaklą, arba jei simptomai yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėjusiu prakaitavimu ir per pusvalandį nesumažėja, rekomenduojama kreiptis į gydytoją. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Nežinoma. **Salutinis poveikis.** Pavieniais atvejais iš pradžių homeopatinis preparatas gali sukelti laikiną būklės pablogėjimą, kuris pasireiškia trumpalaikiu veido odos paraudimu, tachikardija (pagreitėjusiu širdies plakimu) ir padažnėjusiu pulsui, edemų atsiradimu, galvos svaigimu, pykinimu ir nedideliais skrandžio funkcijos sutrikimais. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Buteliuke yra 30 ml tirpalo. Nereceptinis vaistinis preparatas. **Rinkodaros teisės turėtojas.** Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Įgaliojatis atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt **Teksto peržiūros data.** 2012-01-19

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieša ar atsiranda salutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.



Distribution Partner
-Heel
Healthcare designed by nature