

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Cralonin geriamieji lašai (tirpalas)

Homeopatinis vaistinis preparatas

**Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Cralonin galima įsigyti be recepto, tačiau jo reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Lapelio turinys

1. Kas yra Cralonin ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Cralonin
3. Kaip vartoti Cralonin
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Cralonin
6. Kita informacija

### 1. KAS YRA CRALONIN IR KAM JIS VARTOJAMAS

Cralonin yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama senatvinių širdies pakitimų, širdies raumens pažeidimo padarinių, neurogeninių širdies veiklos sutrikimų sukeltiems simptomams lengvinti.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

*Pastaba.* Jei imate dusti (trūksta oro) arba atsiranda krūtinės skausmas, kuris gali plisti į rankas, viršutinę pilvo dalį arba kaklą, arba jei simptomai yra susiję su nerimu, pykinimu, vėmimu, padidėjusiu prakaitavimu ir per pusvalandį nesumažėja, privalote kreiptis į gydytoją. Nepasitarus su gydytoju preparato negalima vartoti pacientams, sergantiems širdies veiklos nepakankamumu. Šio preparato negalima vartoti vietoj kitų gydytojo skirtų vaistų.

### 2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT CRALONIN

#### Cralonin vartoti negalima

Jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Cralonin geriamųjų lašų medžiagai.

#### Kitų vaistų vartojimas

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Prieš vartojant bet kokį vaistą nėštumo ir žindymo laikotarpiu, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

#### Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Cralonin gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Cralonin medžiagas**

Šio vaisto sudėtyje yra 45 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 178 mg 10 lašų dozėje (atitinka 4,5 ml alaus, 1,88 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 59,84 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindytėms, vaikams ir didelės rizikos grupės pacientams (pvz., sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija).

### **3. KAIP VARTOTI CRALONIN**

Cralonin visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vaisto dozavimą gydytojas turi nustatyti atsižvelgdamas į paciento būklę.

Suaugusiems žmonėms: gydant ilgai įprastinis dozavimas – po 10–20 lašų 3 kartus per parą, ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 15 min., bet ne daugiau kaip 12 kartų per parą.

*Perspėjimas.* Tokių dozių ilgai be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Cralonin geriamųjų lašų netinka vartoti vaikams.

#### **Pavartojus per didelę Cralonin dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Cralonin**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Cralonin**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Cralonin, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Pavieniais atvejais iš pradžių homeopatinis preparatas gali sukelti laikiną būklės pablogėjimą, kuris pasireiškia trumpalaikiu veido odos paraudimu, tachikardija (pagreitetėjusiu širdies plakimu) ir padažnėjusiu pulsą, edemų atsiradimu, galvos svaigimu, pykinimu ir nedideliais skrandžio funkcijos sutrikimais.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI CRALONIN**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

Ant dėžutės ir buteliuko etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Cralonin vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Pirmą kartą atidarius buteliuką, tirpalo tinkamumo laikas – 6 mėn.

### **6. KITA INFORMACIJA**

### **Cralonin sudėtis**

- 100 ml tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Crataegus Ø 70 ml, Spigelia anthelmia D2 1 ml, Kalium carbonicum D3 1 ml.
- Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.  
1 ml tirpalo yra 20 lašų.

### **Cralonin išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Cralonin geriamieji lašai yra skaidrus (gali atsirasti šiek tiek dribsnių), tamsiai rudas (kaštoninis) tirpalas.

Pakuotėje yra 30 ml arba 100 ml buteliukas, užkimštas aplikatoriumi su lašintuvu ir užsuktas dangteliu.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Straße 2-4

76532 Baden-Baden

Vokietija

Tel. +49 7221 501 00

Faksas +49 7221 501 485

El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis”

Partizanų g. 198-5

LT-50324 Kaunas

Tel., faksas +370 37 452 559

El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

**Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-01-19**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>