

## PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

### Zeel T tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

#### **Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.**

Zeel T tablečių galima įsigyti be recepto, tačiau jų reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

#### **Lapelio turinys**

1. Kas yra Zeel T tabletės ir kam jos vartojamos
2. Kas žinotina prieš vartojant Zeel T tablečių
3. Kaip vartoti Zeel T tabletes
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Zeel T tabletes
6. Kita informacija

#### **1. KAS YRA ZEEL T TABLETĖS IR KAM JOS VARTOJAMOS**

Zeel T tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama, jei reikia lengvinti sąnarių ligų, ypač susijusių su skausmu, patinimu ar sąnarių nejudrumu, simptomus.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

#### **2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ZEEL T TABLEČIŲ**

##### **Zeel T tablečių vartoti negalima**

Jeigu yra padidėjęs jautrumas:

- nuodingajam žagreniui;
- arnikai;
- bet kuriai kitai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei Zeel T tablečių medžiagai.

Sergant arba sirgus kepenų liga arba kartu vartojant hepatotoksinių medžiagų, preparato galima vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.

##### **Kitų vaistų vartojimas**

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.

Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

##### **Nėštumas ir žindymo laikotarpis**

Dėl sudedamosios dalies sangvinarijos (*Sanguinaria*) nevartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

##### **Vairavimas ir mechanizmų valdymas**

Zeel T tabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

### **Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Zeel T tablečių medžiagas**

Šiame preparate yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

Gydant vaistais, kuriuose yra sangvinarijų (*Sanguinaria*) alkaloidų, pavieniais atvejais pastebėta padidėjęs kepenų funkcijos fermentų (transaminazių) aktyvumas ir bilirubino kiekis serume, pasireiškė vaistų sukelta gelta (su vaistais susijęs toksinis hepatitas). Tokie pokyčiai sumažėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.

Vaisto vartojant ilgiau nei 4 savaites, reikia sekti kepenų funkcijos rodmenis.

### **3. KAIP VARTOTI ZEEL T TABLETES**

Zeel T tablečių visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems paaugliams: paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3–5 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

#### **Pavartojus per didelę Zeel T tablečių dozę**

Pranešimų apie perdozavimą negauta.

#### **Pamiršus pavartoti Zeel T tablečių**

Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

#### **Nustojus vartoti Zeel T tablečių**

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

### **4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS**

Zeel T tabletės, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Labai retais atvejais, net ir po kelių dienų vartojimo, gali atsirasti virškinimo trakto sutrikimų ar odos reakcijų.

Pavieniais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų žmonėms, kurių yra padidėjęs jautrumas astrinių (graižžiedžių) šeimos augalams, pvz., arnikai.

Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

### **5. KAIP LAIKYTI ZEEL T TABLETES**

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant dėžutės ir talpyklės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Zeel T tablečių vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

### **6. KITA INFORMACIJA**

**Zeel T tablečių sudėtis**

- 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Cartilago suis D4 0,3 mg, Funiculus umbilicalis suis D4 0,3 mg, Embryo suis D4 0,3 mg, Placenta suis D4 0,3 mg, Rhus toxicodendron D2 0,54 mg, Arnica montana D1 0,6 mg, Solanum dulcamara D2 0,15 mg, Symphytum officinale D8 0,15 mg, Sanguinaria canadensis D3 0,45 mg, Sulfur D6 0,54 mg, Naidum D6 0,03 mg, Coenzym A D6 0,03 mg, Acidum alpha-liponicum D6 0,03 mg, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,03 mg, Acidum silicicum D6 3,0 mg.
- Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

### **Zeel T tablečių išvaizda ir kiekis pakuotėje**

Zeel T tabletės yra nuo baltos iki gelsvai baltos spalvos, apvalios, plokščios, su nusklembtomis briaunomis. Pakuotėje yra 50 tablečių.

### **Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas**

Biologische Heilmittel Heel GmbH  
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4  
76532 Baden-Baden  
Vokietija  
Tel. +49 7221 501 00  
Faksas +49 7221 501 485  
El. paštas [info@heel.de](mailto:info@heel.de)

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis“  
Partizanų g. 198-5  
LT-50324 Kaunas  
Tel., faksas +370 37 452 559  
El. paštas [info@heel.lt](mailto:info@heel.lt)

### **Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2011-09-07**

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje <http://www.vvkt.lt/>