



Homeopatinis požiūris į nervus, stresą ir nemigą

Dažniausiai užduodami klausimai
1 knyga



sveikos gyvensenos
akademija

Neurexan®

Atkurkite vidinę pusiausvyrą



Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas

Neurexan® tabletės • Homeopatinis vaistinis preparatas

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos. Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Vartojimas vaikams.** Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra. **Sąveika su kitais vaistinėmis preparatais ir kitokia sąveika.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų). **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 50 tablečių. **Nereceptinis vaistinis preparatas.**

Rinkodaros teisės turėtojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija)

Įgaliotasis atstovas. UAB „Farmahelis“, www.heel.lt **Teksto peržiūros data.** 2013-02-13

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

DistributionPartner



Healthcare designed by nature

www.heel.lt

Kodėl parašėme šią knygą Jums?

Nuo pat mažens mums skiepijamas ne visai teisingas požiūris į ligą ir jos gydymą. Jei skauda ranką – išgeriame vaistų *nuo skausmo*, jei pakilo temperatūra – pavartojame vaistų *nuo temperatūros*. Tačiau tai yra ne kas kita, kaip simptomų slopinimas. O ligos priežastis yra kita, tad ir temperatūra pakilo dėl tam tikros priežasties, o ir ranką skauda taip pat dėl konkrečios priežasties. Temperatūra – tai ligos simptomas, skausmas – taip pat ligos simptomas. Šiuolaikinė homeopatija kelia klausimus – *kodėl prasidėjo liga?* kokia yra atsiradusio simptomo priežastis? – ir veikia būtent tą priežastį, t. y. gydo ligą iš esmės. Simptomas rodo, kad organizmas jau pradėjo gydytis, todėl homeopatiniais preparatais simptomas yra valdomas ir taip skatinama organizmo savireguliacija. Šiuolaikinio homeopatinio gydymo esmė – gydyti ligonį, o ne ligą.

Šiandien, kai žmonės visame pasaulyje serga vis sudėtingesnėmis ligomis, kai kas antras vaikas gimsta jau būdamas alergiškas, daugėja onkologinių ligų ir sergančiųjų cukriniu diabetu, būtina kalbėti apie tai, kodėl reikia skleisti šį naują požiūrį į mediciną, nes šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo sistema, **turinti kitokį požiūrį į ligą nei įprastinis gydymas.** Homeopatija ieško ligos priežasties, veikia tą priežastį ir taip padeda pasveikti.

Tad šiandien galime drąsiai teigti, kad šiuolaikinė homeopatija – tai gydymo metodas, dažniausiai neturintis šalutinio poveikio ir orientuotas į priežasties šalinimą, paskatindamas organizmo bioreguliacinius procesus. Plačiau skaitykite www.siuolaikinehomeopatija.lt.



Homeopatijos istorija

Jaunas Leipcigo universitetą baigęs gydytojas Samuelis Hanemanas (1755–1843) pradėjęs praktikinę karjerą greitai nusivylė, nes negalėjo padėti žmonėms. Tačiau jis rado informacijos, kad iš chinės medžio žievės pagamintas preparatas gali būti vartojamas maliarijai gydyti. Informacija jam sukėlė abejonių, ir jis, būdamas sveikas, pradėjo eksperimentą su savimi, t. y. vartojo *China officinalis*. Kiekviena nauja dozė sukeldavo būklę, labai primenančią maliarijos priepuolį. Šis atradimas, kad preparatas sukelia simptomus, kuriuos jis turi gydyti, S. Hanemaną labai nustebino ir davė impulsą pradėti mokslinius tyrimus.

Pirmąjį mokslinį straipsnį S. Hanemanas atspausdino 1796 m., gydymo metodą pavadino homeopatija. Homeopatija (*homios* – „panašus“, *pathos* – „liga, kančia“ (panašus į ligą)) – tai gydymo būdas, kai vartojamos labai mažos dozės vaistų, kurių daug didesnės dozės sveiko žmogaus organizme sukelia reiškinius, panašius į gydomos ligos simptomus.

Bet homeopatija ne gimė, o atgimė, nes S. Hanemanas nebuvo pirmasis ligoms gydyti pasiūlęs panašumo principą. Dar Hipokratas (460–370 m. pr. Kr.) sakė, kad „negalavimą sukėlę dalykai gali ir jį išgydyti“. O ir mūsų seneliai bei tėvai sakydavo: „Nuo ko susirgai, tuo ir gydykis.“

Homeopatijoje vaistai parenkami pagal panašumo į ligos simptomus principą. Pvz., svogūnas sukelia akių perštėjimą, nosies varvėjimą, o tokie simptomai gali pasireikšti peršalimo ar virusinių ligų pradžioje. Tokiu atveju gydytojas homeopatas paskirtą homeopatinį monopreparatą, kuris paruoštas iš svogūno (lot. *Allium cepa*).

Homeopatijoje ligos simptomas yra požymis, pagal kurį ligoniui skiriamas homeopatinis preparatas, suaktyvinantis organizmo „vidinį gydytoją“. Pavyzdžiui, karščiavimas yra natūrali organizmo išraiška, kuria ginamasi nuo ligos sukėlėjų (virusų, bakterijų, toksinų). Tad, slopindami karščiavimą, slopiname ir organizmo „vidinį gydytoją“. Šiuolaikinės homeopatijos požiūriu, dirbtinis skatinimas kuo greičiau nuslopinti temperatūrą (ypač kai ji yra iki 38 laipsnių) padaro meškos paslaugą organizmui ir imuninei sistemai ir gali padėti atsigausti ligai.

Nuslopinus simptomą, bet nepašalinus priežasties, simptomas atsinaujina, ir liga pereina į kitą, sunkesnę fazę.

Nervai ir stresas

Vienos streso priežasties nėra – jų daugybė, ir visiškai išvengti įtampą keliančių situacijų neįmanoma. Stresą ir nervinę įtampą gali sukelti skriauda, netektis, informacijos perteklius, fizinis ar dvasinis skausmas, darbas ar grėsmė jo netekti, griežti darbo reikalavimai, nuolatinis skubėjimas, netgi žinios, kurias girdime per televizorių, ir t. t. Stresą, beje, gali sukelti ir teigiami įvykiai, tokie kaip vestuvės, paaukštinimas pareigose, egzaminas, pan. Tačiau trumpalaikis stresas nėra pavojingas sveikatai, jis stimuliuoja visas organizmo apsaugines sistemas, padaro žmogų atsparesnį. Pavojingas – nuolatinis, besitęsiantis stresas.

Kita šių dienų ryškė – dideli darbo krūviai, darbas savaitgaliais, viršvalandžiai, poilsio trūkumas. Visa tai neišvengiamai sukelia nuovargį. Jei atsibundate jau pavargę, neturite jėgų eiti į darbą, o ir namie nieko daryti nesinori, jei erzina kolegų veidai, jaučiate silpnumą, mieguistumą, tai gali būti nuovargio požymiai. Daugelis mano, kad, įtemptai dirbę mėnesį, pusmetį, metus ar net kelerius, jie vėliau, kai išspręs visas problemas, išeis atostogų ir su kaupiu atsipūs bei atsigaus. Įtemptas darbas, poilsio trūkumas gali būti didžiulė ryškė organizmui. Juk nuovargis kaupiasi, tačiau pailsėti ateičiai ar sukaupti poilsio „atsargų“ neįmanoma. Todėl labai svarbus yra darbo ir poilsio režimas.

Nuolatinis stresas, nuovargis ir nervinė įtampa gali sukelti daugybę negalavimų – depresiją, nerimą, miego sutrikimus, galvos skausmus, širdies ir kraujagyslių ligas, virškinimo sistemos ir kitus sutrikimus.

1 lentelė. Nervų sistemos ligų vystymasis

Negydomos ligos progresuoja ir pereina į sunkias, lėtines ligas

I stadija	II stadija	III stadija	Lėtinės, sunkiai pagydamos ligos
Nerimas Padidėjęs nervų jautrumas Pervargimas	Depresinė nuotaika Nemiga Nervinė tachikardija	Nervinis navikas Ganglijų neuroma Sunkiųjų metalų sankaupos	Parkinsonas Alzheimeris Išsėtinė sklerozė
Intensyvus minčių srautas	Nerviniai sutrikimai su motorikos sujudinimu	Amiloido sankaupa	Poliomielitas Glioma, meningioma
Padidėjęs adrenalino ir noradrenalino išsiskyrimas	Karščio pylimas Hipervagotonija	Neuroma	Adisono liga
Padidėjusi neurologinė sekrecija	Neuritas	Neuroma	Epilepsija

Homeopatiniai vaistai, padedantys lengvinti simptomus

Neurexan tabletės (Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.)	<i>Nervoheel N</i> tabletės <i>Ignatia-Homaccord</i> geriamieji lašai (Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.)	<i>Neurexan</i> tabletės <i>Nervoheel N</i> tabletės <i>Ignatia hom.</i> geriamieji lašai <i>Ypsiloheel N</i> tabletės	Papildoma terapija <i>Neurexan</i> tabletės <i>Nervoheel N</i> tabletės <i>Ignatia hom.</i> geriamieji lašai <i>Ypsiloheel N</i> tabletės <i>Galium-Heel N</i> geriamieji lašai <i>Detox-Kit</i> homeopatinių vaistų rinkinys (geriamieji lašai) <i>Detox-Kit</i> homeopatinių vaistų rinkinys (geriamieji lašai)
<i>Nervoheel N</i> tabletės (Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.)	<i>Ypsiloheel N</i> tabletės (Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.)	<i>Detox-Kit</i> homeopatinių vaistų rinkinys (geriamieji lašai) • <i>Nux vomica-Homaccord</i> • <i>Lymphomyosot</i> • <i>Berberis-Homaccord</i>	<i>Detox-Kit</i> homeopatinių vaistų rinkinys (geriamieji lašai) • <i>Nux vomica-Homaccord</i> • <i>Lymphomyosot</i> • <i>Berberis-Homaccord</i>

2 lentelė. Kaip veikia *Neurexan* sudedamosios dalys*

<i>Passiflora incarnata</i>	<i>Avena sativa</i>	<i>Coffea arabica</i>	<i>Zincum isovalerianicum/zincum valerianicum</i>
• Nemiga • Nerimas • Neuralgijos • Nervinė tachikardija ir spazmai	Miego sutrikimai po susijaudinimo ir protinės įtampos, pervargimo, besivaduojant nuo narkotikų ir alkoholinių gėrimų priklausomybės	• Užmigimo sunkumai • Intensyvus minčių srautas • Nerimas • Egzaminų stresas, sukeliantis nemigą, sutrikdantis atmintį • Neurotoniniai skausmai	• Nerviniai sutrikimai su motoriniu sujudinimu (neramių kojų sindromas) • Nervingumas • Per didelės dirglumas • Sudirgimas, lydymas sutrikdyto miego • Neuralgija

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais

*HAB 2012

Dažniausiai užduodami klausimai apie nervų ligas ir stresą

Kalbamės su gydytoja homeopate Diana LAURYNAITIENE.

Kaip vyrai ir moterys reaguoja į stresą?

Vyrams dažnai stresą kelia didelė atsakomybė, nepakeliamas psichologinis ir fizinis krūvis, susirūpinimas dėl darbo vietos, pensinis amžius. Reaguodami į stresą vyrai užsisklendžia savyje, griebiasi cigarečių ar alkoholio, kai kurie susinervinę daugiau valgo, gali neatsakingai vairuoti automobilį, dar kiti nepasitenkinimą išlieja „nuleisdami garą“ pykčiu, įtampa, sukeldami stresines situacijas.

Moterys į stresą reaguoja emocionaliai, joms reikia pasiguosti, išsikalbėti. Moterims stresinės situacijos gali kilti ir dėl to, kad jos privalo būti ne tik geros darbuotojos pasirinktoje veikloje, bet ir geros mamos, žmonos, dukros, taip pat tai, kad, siekdamos karjeros, jos turi būti dvigubai geresnės už vyrus. Moterys išgyvena dėl išvaizdos pokyčių, ne visos ramiai priima senėjimo nulemtus pokyčius, kai kurios klimakterinį periodą suvokia kaip didžiulę tragediją, kaip likimo smūgį.

Stresą gali patirti bet kokią socialinę padėtį užimantys žmonės ir bet kuriuo metų laiku. Nuo jo kenčia ir seni, ir jauni.

Ar yra homeopatinių preparatų, kurie galėtų padėti esant stresui, įtampai, nerimui ar kitiems nerviniams sutrikimams?

Taip, homeopatija puikiai padeda esant nerviniams sutrikimams. Atsižvelgiant į simptomus, galima rinktis iš tokių preparatų, kaip *Nervoheel N*, *Ignatia-Homaccord*, *Ypsiloheel N*, *Neurexan*. Kiekvienas preparatas turi savo pritaikymo galimybes. *Nervoheel N* tabletės lengvina nuovargio sukeltus nervinius negalavimus; *Neurexan* tabletės – miego sutrikimus ir nervingumą. *Ypsiloheel N* tabletės padeda esant nerviniams sutrikimams, pvz., jaučiant širdies plakimą, gumulą gerklėje, miego sutrikimus, skrandžio ir žarnyno negalavimus. *Ignatia-Homaccord* geriamieji lašai lengvina nervinius sutrikimus, kurie pasireiškia depresiška nuotaika.

Ką galima vartoti, kai žmogų vargina bloga nuotaika, liūdesys ar pesimizmas po artimojo mirties?

Ignatia-Homaccord geriamieji lašai yra efektyvus homeopatinis preparatas po artimojo netekties, kai ilgą laiką žmogus negali susitaikyti su tokia situacija ir pasireiškia

liūdesys, apatija, depresinė nuotaika. Šį preparatą iš karto galima vartoti netekus artimojo, kad lengviau priimtume gyvenimo situacijas.

Kada efektyviausia vartoti *Neurexan* tabletes?

Neurexan visų pirma yra vaistas nervingumui ir vidinei įtampai mažinti, jis efektyviai reguliuoja miegą. Miegas tampa geresnis, o pailsėjus galima geriau įveikti kasdienes gyvenimo situacijas. *Neurexan* sugrąžina vidinę pusiausvyrą ir ramybę.

Ar galima *Neurexan* vartoti ilgesnį laiką, ar nekyla pavojus, kad prie jo priprasiu?

Šį vaistinį preparatą galima vartoti ilgesnį laiką, prie jo nepriprantama. Jei savijauta per 2 savaites nepagerėja, tikslinga kreiptis į gydytoją. Priešingai nei kai kurie raminamieji ar migdomieji vaistai, *Neurexan* ne tik nesukelia pripratimo, bet ir netrikdo budrumo vairuojant, nesukelia dėmesio slopinimo, dėl atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio poveikio koncentracija ir dėmesys pagerėja.

Mano dukra laiko egzaminus, ar ji gali vartoti *Neurexan*?

Neurexan yra puikus vaistas nervingumui ir vidinei įtampai įveikti, kurie atsiranda prieš egzaminus ir egzaminų metu. Dėl atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio poveikio gali pagerėti koncentracija, dėmesys, padidėti pajėgumas mokytis.

Klimakterinio periodo laikotarpiu dažnai atsiranda įtampa ir nervingumas. Ar gali padėti *Neurexan*?

Neurexan labai veiksmingas klimakteriniu periodu, kai jautriai reaguojama į gyvenimo situacijas, kai yra nuotaikų svyravimų. *Neurexan* visų pirma yra vaistas nervingumui ir vidinei įtampai mažinti, taip pat veiksmingai reguliuoja miegą. Pagal vyraujančius simptomus gali tekti derinti *Neurexan* su *Nervoheel N*, *Ignatia-Homaccord*, tai gali patarti gydytojas. Klimakteriniu periodu yra svarbi ir sveikos gyvensenos programa.

Mano mama vartoja daug vaistų įvairioms ligoms gydyti. Ar ji gali papildomai vartoti ir *Neurexan* tabletes?

Vyresnio amžiaus pacientai, kurie vartoja daug įvairių vaistų, turi visuomet pasitarti su gydančiu gydytoju, kaip derinti preparatus. Homeopatinis vaistas *Neurexan* tinka vartoti kartu su kitais vaistais. Sergantiesiems lėtinėmis ligomis, norint suaktyvinti savigydos (savireguliacijos) procesus, detoksikuoti organizmą, sustiprinti imunitetą ir nervų sistemas tikslinga pavartoti homeopatinių preparatų.

Kaip greitai veikia *Neurexan*?

Poveikis gali pasireikšti jau po 15–30 min., tai priklauso nuo situacijos ir paciento.

Kad būtų greitas poveikis esant nerimui, *Neurexan* patariama vartoti po 1 tab. kas 0,5–1 val. 2–3 kartus, jei yra būtinybė, tai tęsti iki 12 kartų per dieną. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje.

Dažnai vargina miego sutrikimai, ypač po sunkios darbo dienos ar patirto streso, ką patartumėt vartoti saugaus, nesukeliančio pripratimo ir slopinimo?

Neurexan veikia visas miego fazes – tiek užmigimą, produktyvų miegą, tiek suteikia efektyvaus pailsėjimo jausmą pabudus. Pripratimo šis preparatas nesukelia, ir žmogus kitą dieną išlieka darbingas. Dėl savo atpalaiduojamojo ir pusiausvyrą atkuriančio poveikio *Neurexan* gerina koncentraciją, dėmesį ir darbingumą.

Kur įsigyti *Neurexan* ir kitų homeopatinių preparatų?

Neurexan galite įsigyti be recepto vaistinėse. Vaistinių sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt.

Mano sūnui po streso, įtampos ar egzaminų atsiranda odos bėrimų. Sūnus yra jautrus, uždaras. Ką tokiu atveju galėtume pavartoti iš homeopatinių preparatų?

Oda – vidinės žmogaus pusiausvyros veidrodys. Odos ligų gydymą tikslinga pradėti nuo organizmo detoksikacijos procesų suaktyvinimo, tam tinka *Detox-Kit* homeopatinių vaistų rinkinys (*Nux vomica-Homaccord*, *Lymphomyosot*, *Berberis-Homaccord*). Odos ligos turi psichologines priežastis, todėl rekomenduojami ir nervų sistemą stiprinantys preparatai *Nervoheel N*, *Ignatia-Homaccord*, *Ypsiloheel N*, *Neurexan*.

Mano dukrai dažnai pasireiškia nerviniai virškinimo sutrikimai ir gumulo jausmas gerklėje, ypač kai reikia kalbėti prieš auditoriją ar ilgo bendravimo metu. Ką galima pavartoti iš homeopatinių preparatų?

Tokiu atveju tiksliausia vartoti *Ypsiloheel N* tab. Jo vartojama nerviniams sutrikimams, pvz., juntamam širdies plakimui, gumului gerklėje, miego sutrikimui, skrandžio ir žarnyno negalavimams, lengvinti. Tai ypač tinkamas vaistas, kai dėl didelio jaudulio ar streso žmogui sunku bendrauti.

Vartojant *Neurexan* nerimo ir miego sutrikimų mažėja. Ką patartumėte, kad šie sutrikimai nesikartotų?

Puiku, kad jūs pajutote *Neurexan* poveikį. Galima šį preparatą vartoti ir trumpai tik

kilus stresui ar prieš svarbų įvykį, kai vargina nerimas. Svarbu suprasti, kad atsiradę simptomai visada turi priežastis. Todėl tikslinga išsiaiškinti, dėl ko kyla nerimas ar miego sutrikimai. Nerimui atsirasti įtakos gali turėti: netinkamas gyvenimo būdas, fizinio aktyvumo trūkumas, darbo ir poilsio režimo pažeidimas, gyvenimo pokyčių baimė, problemos darbe, nesutarimai, konfliktai šeimoje ar tarpasmeniniuose santykiuose. Ne veltui sakoma, kad nemiga – tai sąžinės balsas, žmogaus vidus (siela) kviečia peržiūrėti gyvenimą, vertybes ir požiūrius.

Dėl individualaus vaistų parinkimo kreipkitės į gydytoją homeopatą. Gydytojų homeopatų sąrašą rasite www.siuolaikinehomeopatija.lt

Homeopatiniai vaistiniai preparatai Biologische Heilmittel Heel GmbH

Neurexan® tabletės

Sudėtis. Vienoje tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Avena sativa D2 0,6 mg, Coffea arabica D12 0,6 mg, Passiflora incarnata D2 0,6 mg, Zincum isovalerianicum D4 0,6 mg. Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Miego sutrikimų ir nervingumo lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: po 1 tabletę 3 kartus per dieną. Ūminiais atvejais – po 1 tabletę kas 0,5–1 val. iki 12 kartų per dieną, po to gydymą tęsti įprastine doze. Prieš nuryjant tabletę reikia ištirpinti burnoje. Ją vartoti likus ne mažiau kaip 30 min. iki valgio.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Neurexan sudėtyje yra laktozės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Vartojimas vaikams. Neurexan negalima vartoti jaunesniems kaip 12 metų vaikams, nes duomenų nėra.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti alerginių reakcijų (pasireiškia mažiau negu 1 iš 10 000 vartotojų).

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje

Pakuotėje yra 50 tablečių.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Ypsiloheel®N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Asa foetida D4 30 mg, Strychnos ignatii D4 30 mg, Paris quadrifolia D4 30 mg, Thuja occidentalis D6 30 mg, Pulsatilla pratensis D4 45 mg, Lachesis mutus D8 45 mg, Nitroglycerinum D6 45 mg.
Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, pvz., juntamo širdies plakimo, gumulo gerklėje, miego sutrikimo, skrandžio ir žarnyno negalavimų, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir paaugliams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Ypsiloheel N* tablečių medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Ignatia-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos ignatii D4 0,5 g, Strychnos ignatii D10 0,5 g, Strychnos ignatii D30 0,5 g, Strychnos ignatii D200 0,5 g, Moschus moschiferus D6 0,5 g, Moschus moschiferus D30 0,5 g, Moschus moschiferus D200 0,5 g.
Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Nervinių sutrikimų, kurie pasireiškia depresiška nuotaika, lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas. Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

Ignatia-Homaccord saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas. Duomenų nėra.

Ilgesnį laiką (daugiau kaip keletą mėnesių) preparato be gydytojo nurodymo vartoti negalima.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei *Ignatia-Homaccord* medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Kadangi *Ignatia-Homaccord* vartojimas pateiktų indikacijų atveju yra paremtas tik homeopatine patirtimi, sunkias būklės formas rekomenduojama gydyti kliniškai patvirtintais gydymo metodais.

Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Nervoheel® N tabletės

Sudėtis. 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum isovalerianicum D4 30 mg.

Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Terapinės indikacijos

Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Pastaba. Jei simptomai nepraeina, pakinta arba atsiranda naujų, turite kreiptis į gydytoją, nes gali reikėti medicininio tyrimo ir gydymo.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną.

Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką).

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Nervoheel N tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso Nervoheel N tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl *Sepia*, kuri yra tamsios spalvos. Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas.

Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – *Lapp* laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Pakuotėje yra 50 tablečių.



Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g, Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g. Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Lengvų skrandžio, žarnų ar kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min.

2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Ilgalaikį (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Nux vomica-Homaccord* geriamųjų lašų medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Nežinomas.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Teucrium scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levothyroxinum D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferrum iodatum D12 10 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Dėl lėtinio tonzilito pasireiškusių limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralų limfos nutekėjimą.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną.

2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną.

6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną.

Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Lymphomyosot geriamųjų lašų medžiagai.

Nepasitarus su gydytoju, nevartoti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (104 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g.

Pagalbinės medžiagos: etanolis (96 %), išgrynintas vanduo.

Terapinės indikacijos

Šlapimo takų uždegimo gydymas.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminių sutrikimų atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną).

Berberis-Homaccord geriamųjų lašų saugumas ir veiksmingumas vaikams, jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama.

Pastaba. Ilgalaiį (kelių mėnesių arba ilgesnį) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei Berberis-Homaccord medžiagai.

Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika. Nežinoma.

Šalutinis poveikis. Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.



Galium-Heel® N geriamieji lašai (tirpalas)

Sudėtis. 100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Galium aparine D3 4 g, Galium mollugo D3 4 g, Sedum acre D3 5 g, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 5 g, Clematis recta D4 5 g, Thuja occidentalis D3 5 g, Caltha palustris D3 5 g, Ononis spinosa D4 5 g, Juniperus communis D4 5 g, Hedera helix D4 5 g, Betula alba D2 5 g, Echinacea D5 5 g, Calcium fluoratum D8 5 g, Phosphorus D8 5 g, Aurum metallicum D10 5 g, Argentum metallicum D8 5 g, Apis mellifica D12 5 g, Acidum nitricum D6 5 g, Urtica urens D3 2 g. Sudėtyje yra 35 % (V/V) etanolio.

Preparato grupė

Homeopatinis vaistinis preparatas be patvirtintų terapinių indikacijų.

Nurodymai

Prieš vartodami preparatą pasitarkite su gydytoju homeopatu.

Jei vartojant preparatą simptomai išlieka, kreipkitės į bendrosios praktikos gydytoją.

Dozavimas ir vartojimo būdas

Suaugusiems žmonėms, 12 metų ir vyresniems vaikams paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną.

Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei *Galium-Heel N* medžiagai.

Ypatingi įspėjimai. Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių).

Kenksmingas sergantiesiems alkoholizmu.

Būtina atsižvelgti nėščiosioms, žindyvėms, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija.

Šalutinis poveikis. *Galium-Heel N*, kaip ir kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Vaistinio preparato kiekis pakuotėje. Buteliuke yra 30 ml tirpalo.




18 Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Nervoheel® N



Moderni
homeopatinė
alternatyva

Nuovargio
sukeltų
nervinių
negalavimų
lengvinimas



Nervoheel N tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Acidum phosphoricum D4 60 mg, Strychnos ignatii D4 60 mg, Sepia officinalis D4 60 mg, Kalium bromatum D4 30 mg, Zincum isovalerianicum D4 30 mg. **Terapinės indikacijos.** Nuovargio sukeltų nervinių negalavimų lengvinimas. Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę du kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną ar du kartus per dieną. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams: vartoti po 1 tabletę vieną kartą per dieną. Tabletę reikia lėtai ištirpinti burnoje. Tabletę reikia vartoti ne valgio metu (daryti pertrauką). **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jautrumas bromui arba bet kuriai veikliajai ar pagalbinei medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Nervoheel N tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Nuo dviejų natūralių sudedamųjų dalių priklauso Nervoheel N tablečių išvaizda ir kvapas. Tablečių spalva gali kisti dėl Sepia, kuri yra tamsios spalvos. Būdingas kvapas, kurį galbūt pajutote, yra dėl valerijono, t. y. vaistažolės, kurios veiksmingumas yra gerai žinomas. Šio vaistinio preparato negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija. **Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika.** Nežinoma. **Nepageidaujamas poveikis.** Nežinomas. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 50 tablečių. Nereceptinis vaistinis preparatas. **Rinkodaros teisės turėtojas.** Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Įgaliotasis atstovas.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt. **Teksto peržiūros data.** 2011-07-28

Distribution Partner
-Heel
Healthcare designed by nature

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Detox-Kit

Organizmą detoksikuojantis
homeopatinis preparatų rinkinys

Efektyvu
Toleruojama
Paprasta vartoti

Lymphomyosot® geriamieji lašai
aktyvina limfinę sistemą, detoksikuoja jungiamąjį audinį ir mezenchimą.

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai
aktyvina skrandžio ir žarnyno sistemų ekskreciją, kepenų veiklą.

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai
aktyvina urogenitalinės bei tulžies sistemų veiklą.

- Aktyvina žalingas medžiagas (toksinus) šalinančias organizmo sistemas – limfinę, virškinamojo trakto, kepenų, inkstų, tulžies.
- Tinka vartoti sergant lėtinėmis ir alerginėmis ligomis, gyvenant užterštoje aplinkoje, kai yra bloga bendra sveikatos būklė.
- Sergant peršalimo ligomis ir gripu iš organizmo greičiau šalinami virusai ir bakterijos.

Lymphomyosot® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Myosotis arvensis D3 5 g, Veronica officinalis D3 5 g, Leucisrum scorodonia D3 5 g, Pinus sylvestris D4 5 g, Gentiana lutea D5 5 g, Equisetum hyemale D4 5 g, Smilax D6 5 g, Scrophularia nodosa D3 5 g, Juglans regia D3 5 g, Calcium phosphoricum D12 5 g, Natrium sulfuricum D4 5 g, Fumaria officinalis D4 5 g, Levosthroanium D12 5 g, Araneus diadematus D6 5 g, Geranium robertianum D4 10 g, Nasturtium officinale D4 10 g, Ferum iodatum D12 10 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų.
Terapinės indikacijos. Dėl lėtinio tonzilių pasireiškusių limfinės edemos ir limfmazgių padidėjimo mažinimas, skatinant natūralių limfos nutekėjimą. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis vaikams. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 15–20 lašų 3 kartus per dieną. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jaunimas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei *Lymphomyosot* geriamųjų lašų medžiagai. Nepasitauso su gydytoju, nevaroti pacientams, sergantiems skydliaukės ligomis. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kėnsmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. Jaunesniems kaip 2 metų vaikams vaisto vartoti nerekomenduojama. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Labai retais atvejais gali prasidėti alerginės reakcijos. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-05-18

Nux vomica-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g (105 ml) tirpalo yra veikliųjų medžiagų: Strychnos nux-vomica D2 0,2 g, Strychnos nux-vomica D10 0,2 g, Strychnos nux-vomica D15 0,2 g, Strychnos nux-vomica D30 0,2 g, Strychnos nux-vomica D200 0,2 g, Strychnos nux-vomica D1000 0,2 g, Bryonia D2 0,2 g, Bryonia D6 0,2 g, Bryonia D10 0,2 g, Bryonia D15 0,2 g, Bryonia D30 0,2 g, Bryonia D200 0,2 g, Bryonia D1000 0,2 g, Lycopodium clavatum D3 0,3 g, Lycopodium clavatum D10 0,3 g, Lycopodium clavatum D30 0,3 g, Lycopodium clavatum D200 0,3 g, Lycopodium clavatum D1000 0,3 g, Citrullus colocynthis D3 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų. **Terapinės indikacijos.** Lengvų skrandžio, žarnų ir kepenų funkcijos sutrikimų ir pilvo pūtimo gydymas. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų: paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimu atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 10 lašų kas 15 min. 2–5 metų vaikams: gerti po 5 lašus 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimu atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 5 lašus kas 15 min. 6–11 metų vaikams: gerti po 7 lašus 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimu atvejais – pradžioje (pirmas dvi valandas) po 7 lašus kas 15 min. Vaikams lašus galima sumaišyti su nedideliu kiekiu vandens. Ilgalaijk (kelių mėnesių) šio preparato vartojimą turi prižiūrėti gydytojas. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jaunimas veikliosios medžiagos arba bet kuriai pagalbinei *Nux vomica-Homaccord* geriamųjų lašų medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kėnsmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Nežinomas. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-10-12

Berberis-Homaccord® geriamieji lašai (tirpalas)
100 g geriamųjų lašų (104 ml) yra veikliųjų medžiagų: Berberis vulgaris D2 0,4 g, Berberis vulgaris D10 0,4 g, Berberis vulgaris D30 0,4 g, Berberis vulgaris D200 0,4 g, Citrullus colocynthis D2 0,3 g, Citrullus colocynthis D10 0,3 g, Citrullus colocynthis D30 0,3 g, Citrullus colocynthis D200 0,3 g, Veratrum album D3 0,3 g, Veratrum album D10 0,3 g, Veratrum album D30 0,3 g, Veratrum album D200 0,3 g, 1 ml tirpalo yra 18 lašų. **Terapinės indikacijos.** Šlapimo takų uždegimo gydymas. Indikacijos pagįstos tik homeopatinis principais. **Dozavimas ir vartojimo metodas.** Suaugusiems žmonėms ir vaikams nuo 12 metų paprastai reikia gerti po 10 lašų 3 kartus per dieną. Ūminiu sutrikimu atvejais – po 10 lašų kas 0,5–1 val. (iki 12 kartų per dieną). Jaunesniems nei 12 metų, nebuvo nustatytas, todėl tokio amžiaus pacientams jų vartoti nerekomenduojama. **Kontraindikacijos.** Padidėjęs jaunimas bet kuriai veikliajai arba pagalbinei *Berberis-Homaccord* medžiagai. **Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės.** Šio vaisto sudėtyje yra 35 tūrio % etanolio (alkoholio), t. y. iki 150,2 mg 10 lašų dozėje (atitinka 3 ml alaus, 1,27 ml vyno, laikant, kad aluje yra 5 tūrio %, vyne – 12 tūrio % etanolio, arba 49,73 ml obuolių sulčių). Kėnsmingas sergantiesiems alkoholizmu. Būtinyje atsivėlginti nešiošioms, žindymams, vaikams ir pacientams, sergantiems kepenų ligomis ar epilepsija. **Sąveika su kitais vaistais: preparatas ir alkoholis.** Nežinoma. **Šalutinis poveikis.** Labai retais atvejais gali atsirasti padidėjusio jautrumo reakcijų. **Vaistinio preparato kiekis pakuotėje.** Pakuotėje yra 30 ml tirpalo. **Teksto peržiūros data.** 2012-07-25



Gydymo trukmė. *Detox-Kit®* sudėtyje esantys visi 3 preparatai turi būti vartojami tokiu pačiu laiku mažiausiai 3 savaitės.

Dozavimas. Kiekvieno preparato vartoti po 10 lašų 3 kartus per dieną.

Vartojimas. Įlašinti kiekvieno preparato po 30 lašų į 0,7–1,5 l vandens (geriau mineralinio, neprisotinto angliavandens) butelį, sumaišyti pavartant ir išgerti per dieną.

Vieno *Detox-Kit®* rinkinio užtenka 3 savaitėms.

Nereceptiniai vaistiniai preparatai.

Rinkodaros teisės turetojas. Biologische Heilmittel Heel GmbH (Vokietija). **Įgaliojatis atstovaus.** UAB „Farmahelis“, www.heel.lt

Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

Distribution Partner
-Heel-
Healthcare designed by nature